

KRITISK INFORMASJON OM MEDISINSK TILSTAND

Hypokalemisk periodisk paralyse

Periodiske paralyser er sjeldne arvelige neuromuskulære sykdommer som kjennetegnes ved akutte anfall med muskelsvakhet.

Anfall kan utløses av karbohydratrike måltider og hard anstrengelse. Akutte anfall kan behandles med inntak av kalium (NB: intravenøs kalium bør unngås).

OBS: Behandling med intravenøs sukkeroppløsning kan utløse paralyseanfall!

Narkose

OBS: Behandling med bedøvelsesmidler kan gi risiko for komplikasjoner (malign hypertermi).

Neuromuskulære blokkere som succinylkolin, og narkosegasser bør unngås.

Unngå høye glukoseverdier og hyperventilering.

Oppdatert juni 2024



UK MEDICAL ALERT INFORMATION

Hypokalemic Periodic Paralysis

Periodic paralysis is a rare hereditary neuromuscular disease characterized by acute attacks with muscle weakness.

Attacks may be triggered by high-carbohydrate meals and exercise. Acute attacks can be treated with potassium (NB: intravenous potassium should be avoided).

Note: Treatment with intravenous dextrose solution may trigger attacks!

Anaesthetics

Note: Anaesthetics may pose a risk of complications (malignant hyperthermia). Neuromuscular blockade (succinylcholine) and inhaled anaesthetic should be avoided.

Avoid high glucose levels and hyperventilation.

Updated june 2024

