

# KJEMISKE DESINFEKSJONSMIDLER

Dette er et utvalg av de mest brukte desinfeksjonsmidlene i sykehjem. Sjekk produktinformasjon fra leverandør for mer informasjon.

Se også [Bruk av desinfeksjonsmidler](#), Statens legemiddelverk.

Produkt	Effekt på:	Begrensninger	Bruksområde	Virketid
<b>Overflate desinfeksjonssprit</b> 70 – 85 % alkohol.	De fleste bakterier og virus <u>unntatt</u> Clostridioides difficile og Norovirus.	Ikke virksomt på synlig søl/ kroppsvæsker (flekkdesinfeksjon)	Rengjorte og <u>tørre</u> flater/utstyr.	Minst 1 min.  Holdes fuktig i hele virketiden, skal fordampe.
<b>Virkon</b> Merk flaske med tidspunkt for utblanding. Holdbar i 5 døgn i flasken. Blanding i beholder for utstyr: Bytt x 1 pr døgn.	De fleste bakterier og virus <u>unntatt</u> Clostridioides difficile og mykobakterier (Tuberkulose).	Ikke egnet på aluminium og kobber.  Kan gi farge på tekstiler.	Rengjorte flater og utstyr.  Flekkdesinfeksjon: Fjern først mest mulig søl/forurensning.  Tekstiler: 10 min. Deretter vask	10 min. 30 min. ved synlig forurensning (flekkdesinfeksjon)  Holdes fuktig i hele virketiden. Vask/skyll av med rent vann.
<b>PeraSafe</b> Merk flaske/holder med tidspunkt for utblanding. Ferdig bruksløsning kan brukes i inntil 12 timer.	Alle bakterier og virus.	Ingen kjente.	Rengjorte flater og utstyr.  Flekkdesinfeksjon: Fjern først mest mulig søl/forurensning.	10 min.  Holdes fuktig i hele virketiden. Vask/skyll av med rent vann.
<b>LifeClean</b> Holdbar i 8 uker etter åpning. (4 uker etter åpning for effekt på Clostridioides difficile). Blanding i beholder for utstyr: Holdbar 8 timer i <u>lukket</u> beholder (3 timer i beholder uten lokk).	Alle bakterier og virus.	Kan gi skjolder på metall- og stålflater (unngås ved å vaske av etter bruk).	Rengjorte flater og utstyr.  Flekkdesinfeksjon: Fjern først mest mulig søl/forurensning.	2 min. 5 min. ved Clostridioides difficile. (LifeClean PLUS har best dokumentert effekt på C. diff.)  Holdes fuktig i hele virketiden. Vask/skyll av med rent vann.

Bruk verneutstyr som anbefalt på sikkerdatatabladd for aktuelt desinfeksjonsmiddel, ev kontakt leverandør. Desinfeksjonsvæske i beholdere skal ha lokk over. Rommet bør ha god ventilasjon. Sprayflasker benyttes ikke pga fare for innånding.