



Lavdose DOXORUBICIN

Indikasjon: Metastatisk CANCER MAMMAE

Behandlingsplan: Gis ukentlig inntil progresjon.

Evaluering: Hver 2. måned.

Spesielle forundersøkelser: EKG (pasienter over 50 år).

Administrering:

Stoff	Dose	Utblanding	Infusjonstid
Doxorubicin	20 mg	100 ml Glucose	10 min

Infusjonsskjema: Finnes ikke (ikke nødvendig).

Max kumulativ dose: Doxorubicin 750 mg/m².

Blodprøvekontroll: Ved hver 3. kur: Hb, hvite og trombocytter.

Dosereduksjon: Hvis hvite < 2,5 og trombocytter < 100, utsettes kuren 1 uke.

Anmerkning:

- ♦ **Doxorubicin:** (Adriamycin) - **Svært vevstoksisk!** Unngå ekstravasering. (infusjon Is ved ekstravasal. Vurder behov for evt. kirurgi).
 - Urinen blir rød.
 - Kardiotoksisk.
- ♦ **Hårtap:** - Nei, evt. litt tynnere i håret. Sjelden parykkbehov.
- ♦ **Kvalme:** - Ingen/svak. Hvis behov for kvalmestillende: Metoklopramid tabl

Spørsmål kan rettes til Kreftavdelingen, tlf. 77 62 67 65