



Caelyx

Indikasjon: Monoterapi for pasienter med metastaserende CA MAMMAE hvor det er økt risiko for hjertekomplikasjoner.

Behandlingsplan: Kur hver 4. uke inntil progresjon eller uakseptabel toksisitet

Evaluering: Etter hver 3. kur.

Forundersøkelser: EKG

Administrering:

Stoff	Dose	Utblanding	Infusjonstid	Kurdag
Caelyx	40 mg/m ²	Doser < 90 mg: i 250 ml Glukose 5 % Doser > 90 mg: i 500 ml Glukose 5 %	Første kur: 90 min. Resterende kurer: 60 min.	1

NB! Fyll alltid iv-settet med Glukose 5 % (se eget arbeidsskjema).

Eget infusjonsskjema: Se [her](#).

Dosejusteringsskjema - hematologisk:

Neutrofile	Trombocytter	Caelyx
> 1.5- 1.9	75-150	Gi ny dose
1.0 - < 1.5	50 - <75	Vent til neutrofile \geq 1.5 og trc \geq 75. Doserevidere uten dosereduksjon
0.5 - < 1.0	25 - < 50	Vent til neutrofile \geq 1.5 og trc \geq 75. Doserevidere uten dosereduksjon
< 0.5	< 25	Vent til neutrofile \geq 1.5 og trc \geq 75. Ny dose med 25% dosereduksjon

Begrensende toksisitet er i hovedsak hudtoksisitet (PPE) og stomatitt.

Dosejustering PPE-reaksjoner – se under:

Antall uker etter behandling:

Toksisitets grad	Standardintervall se under*	Standardintervall* + 1 uke	Standardintervall* + 2 uke
0 (ingen symptomer).	Gi ny dose.	Gå tilbake til standard intervall.	Gå tilbake til standard intervall.
1 (lett erytem, hoven eller flassende hud, påvirker ikke daglige aktiviteter).	Gi ny dose. Hvis pas. tidligere har hatt grad 3-4 reaksjon vent ytterligere 1 uke.	Gi ny dose. Hvis pas. har hatt grad 3-4 reaksjon vent 1 uke.	25% dosereduksjon, gå tilbake til standard intervall.
2 Erytem, hoven, flassende hud, blemmer eller sår <2 cm . Påvirker, men hindrer ikke daglige aktiviteter.	Vent ytterligere 1 uke.	Vent ytterligere 1 uke.	25% dosereduksjon, gå tilbake til standard intervall.
3 Sår eller blemmer som forvansker daglige aktiviteter. Kan ikke bruke vanlige klær.	Vent ytterligere 1 uke.	Vent ytterligere 1 uke.	Avbryt behandlingen.
4 Infeksiøse komplikasjoner, sengeliggende, sykehusinnleggelse.	Vent ytterligere 1 uke.	Vent ytterligere 1 uke.	Avbryt behandlingen.

Blodprøvekontroll: Hb, neutrofile, hvite, trombocytter ca dag 21 ("forsinket" nadir).

Anmerkning:

- ♦ **Caelyx**
 - **Vesirriterende stoff.** Is ved ekstravasal infusjon.
 - Urinen kan bli rødfarget.
 - Pasienten bør overvåkes de første 10-15 min av infusjonen da det kan inntre infusjonsreaksjoner. Normalt ikke fare for anafylaksi. Dersom reaksjoner som varmfølelse i ansiktet, pustevansker, frysninger, tegn til BT-fall, stoppes infusjonen umiddelbart, og passende premedisinering gis (antihistamin, steroider). Infusjonen kan gjenopptas når symptomene har gitt seg med dobbelt så lang infusjonstid. Ved neste kur gis da premedikasjon før oppstart av kur.

 - **PPE (Palmo-Plantart Erytem); "hånd-fot syndrom"** (hudreaksjoner) kan være dosebegrensende. Oppstår hos ca 6 % av pas. Utslett (rødme, ømhet, hevelse, flassing, små hvite blemmer) som først og fremst rammer håndflater og fotsåler. Også andre hudområder som utsettes for trykk/gnisninger. Ved å utsette neste behandling til sympt. har gitt seg (1-2 uker), vil utslettet vanligvis være lite plagsomt og forsvinner av seg selv!
Se eget pasientinformasjonsskriv neste side!

 - **Mucositt** kan forekomme. For å redusere sjansen for å få mucositt bør man ikke spise og drikke for varm og sterkt krydret mat uken etter infusjonen.

 - Obs diabetespasienter da Caelyx gis med Glukoseløsning.

- ♦ **Hårtap:**
 - Nei.

- ♦ **Kvalme:**
 - Moderat. Kvalmestillende: Ondansetron 8 mg x 2 dgl.

Spørsmål kan rettes til Kreftavdelingen, tlf. 77 62 67 65

Se neste side for pasientinformasjon.

Pasientinformasjon vedr. hudreaksjoner (PPE).

(Tatt fra Schering Plough's informasjonshfte.)

Allment:

- Kontroller daglig alle steder på kroppen der hud ligger mot hud, hudfolder og steder der huden utsettes for trykk, støt eller friksjon. Obs. hender, fotsåler, armhuler, mellom knær og lår.
- Oppdager du rødme, opphovning, ømhet, flassing eller blærer på huden må du informere din lege/sykepleier.

4 -7 dager etter Caelyx infusjon:

- Du bør sitte og ligge på myke flater
- Unngå hud mot hud (legg evt på gasbind, vaselin)
- Bruk ikke stramtsittende bandasjering eller tape på huden
- Benytt pyjamas og plasser en pute mellom knærne når du sover
- Unngå aktiviteter der det er risiko for at hudflater gnis mot hverandre
- Hard trening skal unngås helt
- Unngå å gå mye, lange turer
- Bruk myke, løstsittende sko
- Unngå for mye varmt vann
 - karbad, boblebad, badstue
 - bruk lunkent vann hvis du skal dusje, ikke varmt
 - varme fotbad
 - vaske opp for hånd

Fra 7 dager etter Caelyx infusjon:

- Etter 7 dager har toppnivået av Caelyx i huden passert, og du trenger ikke lengre følge de ovennevnte forholdsregler.
- Etter dette tidspunkt kan t.o.m. varmt vann være til hjelp. Varmt vann øker blodsirkulasjonen og lymfedrenasjen i huden, som igjen trolig øker fjerningen av legemiddelet i huden.

Lindrende prosedyrer:

Følges de 3 første dagene etter Caelyxbehandlingen, og opptil 6 dager dersom symptomene ikke går over.

- Sug på isbiter eller spis is
 - Avstå fra varm og krydret mat og drikke
 - Hold hender og føtter i kaldt vann ved behov
 - Bruke myke løstsittende sko
 - Ta kalde bad
-
- DMSO/betnovat krem påføres affiserte områder 2 ganger daglig.
 - 20 ml DMSO blandes i 20 g Betnovat krem. Kremen er holdbar i 3 måneder.Lages på apotek
 - Vit. B6 (Pyridoxin) 100 mg x 2 daglig i 2 uker etter hver infusjon anbefales.