



## GEMCITABIN ved Ca mamma

- Indikasjon:** Metastatisk CA. MAMMAE
- Behandlingsplan:** Kur gis en gang ukentlig i 7 uker.  
Deretter 1 ukes pause.
- Videre gis kuren ukentlig i 3 uker.  
Deretter 1 ukes pause.
- Evaluerings:** Etter 8 ukers behandling; dvs. etter 7 doser Gemcitabin.  
Videre evaluering hver 8. uke.
- Spesielle forundersøkelser:** Ingen.

### Administrering:

Stoff	Dose	Utblanding	Infusjonstid	Kurdag
Gemcitabin	1000 mg/m <sup>2</sup>	250 ml NaCl	30 min.	1

Eget infusjonsskjema: Se [her](#).

### Dosejusteringsskjema:

Neutrofile	Trombocytter	Gemcitabin -dose
≥ 1.5	≥ 100	1000 mg/m <sup>2</sup>
1.0 – 1.5	50 - 100	750 mg/m <sup>2</sup>
< 1.0	< 50	Utsett kur 1 uke og gi 750 mg/m <sup>2</sup> .

- Blodprøvekontroll:** Ukentlige prøver de første 3 uker:  
Hb, neutrofile, hv, trc.
- Deretter tas disse prøvene hver 2. uke.

**Anmerkning:**

- ♦ **Gemcitabin:** Gastrointestinale: Kvalme, diarè, forstoppelse.  
Hud: Allergiske hudreaksjoner kan forekomme.  
Såre munnslimhinner hos enkelte.  
Muskelsmerter.
- ♦ **Hårtap:** - Ja. Parykkbehov.
- ♦ **Kvalme:** - Moderat. Kvalmestillende: Serotoninantagonist.

**Spørsmål kan rettes til Kreftavdelingen, tlf. 77 62 67 65**