



NAVELBINE

Indikasjon: Palliativ behandling for metastaserende brystkreft (2.-3. linjes behandling).

Behandlingsmål: Palliativt inntil progresjon.

Evaluering: Hver 2-3. måned

Spesielle forundersøkelser/premedikasjon: Nei.

Administrering *intravenøst:*

Stoff	Dose	Administrasjon	Dag
Navelbine	25 mg/m ² Evt. øke til 30 mg/m ² , se under	Bolusinfusjon (i 100 ml NaCl 0.9%) over 15 min. *	Ukentlig (evt 2 uker kur, 1 uke pause)

*Etter Navelbine-administrering må venen skylles godt med NaCl.

Eget infusjonsskjema: Se [her](#).

Administrering *per oralt:*

Stoff	Dose	Administrasjon	Dag
Navelbine	60 mg/m ² en gang pr uke. Evt. øke til 80mg/m ² etter 3 kurer, se under	Svelges hele. Tas sammen med mat. Oppbevares kaldt.	Ukentlig

Blodprøvekontroll: Hb, hvite, nøytrofile, trombocytter ukentlig.

Ekvivalente doser:

Navelbine oral	Navelbine i.v.
80 mg/m ²	30 mg/m ²
60 mg/m ²	25 mg/m ²

Dosejustering:

Utsett kur 1 uke ved nøytrofile granulocytter < 1.0 på kurdagen

Vurder doseøkning etter 3 doser etter følgende skjema:

Nøytrofiltall ved de 3 første doser med 60 mg/m ² /uke po eller 25 mg/m ² /uke iv	Nøytrofile >1,0	Nøytrofile 0,5-1,0 (1 episode)	Nøytrofile 0,5-1,0 (2 episoder)	Nøytrofile <0,5
Anbefalt dose fra og med 4. dose	80 po 30 iv	80 po 30 iv	60 po 25 iv	60 po 25 iv

Om de nøytrofile granulocytene holder seg over 1,0 ved en dose på 60mg/ m² (oral) eller 25mg/m² (iv), kan en på nytt forsøke å øke dose til 80mg/ m² (oral) eller 30 mg/m² (iv). Dosejustering er beskrevet i Felleskatalogen.

Alternativ kan man gi kur i 2 uker og 1 uke pause (dag 1, 8 og 22). Da benyttes dosene 60mg/ m² (oral) eller 25mg/m² (iv).

I kombinasjonsterapi opprettholdes vanligvis den vanlige dosen, mens hyppigheten reduseres til 1. og 5. dag (eller 1. og 8. dag) hver tredje uke.

Bivirkninger Navelbine:

- ♦ **Ekstravasering** -Svært vevstoksisk. Avbryt infusjonen. Varm opp (skal ikke nedkjøles), kontakt lege.
- ♦ **Hematopoetisk:** -Begrensede toksisitet er nøytropeni
-Anemi. Sjelden trombocytopeni
- ♦ **Nervesystem:** -Lettgradig tap av senerereflekser
- ♦ **Hårtap:** -Sjelden
- ♦ **GI:** -Kvalme, oppkast, diaré
-Neuroobstipasjon hos ca 10%
- ♦ **Kvalme:** -Lite – moderat.
-Kvalmeregime: Metoklopramid po, evt. Ondansetron 4-8 mg v/b

Doseringstabell for tabletter:

Kropps- overflate (m ²)	60 mg/m ²	80 mg/m ²
	Dose i mg	
1,3	80	100
1,4	80	110
1,5	90	120
1,6	100	130
1,7	100	140
1,8	110	140
1,9	110	150
≥ 2	120	160

Spørsmål kan rettes til Kreftavdelingen, tlf. 77 62 67 65