



Paclitaxel ukedose, metastatisk

Indikasjon: - Metastatisk HER2+ brystkreft kombinert med HER2-rettet
rettet
- Metastatisk HER2 neg. brystkreft 2. linje.

Behandlingsplan: Gis ukentlig inntil progresjon.

Evaluering: Etter kur 6, 12 og 20. Videre hver 8. kur.

Forundersøkelser: EKG

Administrering:

Stoff	Dose	Utblanding	Infusjonstid
Paclitaxel	80 mg/m ²	250 ml NaCl	1 time

Eget infusjonsskjema: Se [her](#) (kur 1 og 2) og [her](#) (kur 3 og videre).

Blodprøvekontroll: Før hver kur: Hb, hvite og trombocytter, plot.

Anmerkning:

Paclitaxel: -Kan gi anafylaktiske reaksjoner hos ca. 1 % (åndenød, hypotensjon, urticaria). Ha katastrofeadrenalin 0,1 mg/ml i beredskap.
-Hypersensitivitesreaksjoner forekommer. Forebygges ved å gi premedikasjon + nøye overvåking av vitale funksjoner og med umiddelbar nærhet under infusjonen.
lege i
den dette! **-Se eget arbeidsskjema ang. dette, samt egen huskeliste for praktiske administreringen av Paclitaxel (vedlegg). Les**
med
-Muskel- og leddsmerter 2 – 3 dager etter infusjon. Kan lindres Napren-E tbl.
-Neutropeni.
-Polynevropati. Ved alvorlige/plagsomme symptomer; kontakt onkolog.

- ♦ **Hårtap:** - Ja, endel hårtap. Av og til parykkbehov.
- ♦ **Kvalme:** - Svak. Kvalmestillende: Metoklopramid tabl, evt. Ondansetron.

Spørsmål kan rettes til Kreftavdelingen, tlf. 77 62 67 65

PRAKTISK ADMINISTRERING AV PACLITAXEL

1. FORBEREDELSE

- **Skal være tilstede på rommet:**
 - O₂
 - BT- apparat
 - Stetoskop
 - Temperaturmål
 - Akuttbrett: Katastrofeadrenalin 0.1 mg/ml – 5 ml
 - Atropin 1 mg/ml – 1 ml
 - Dexklorfeniramin 5 mg/ml – 1 ml
 - Solu-Cortef 250 mg
 - Bricanyl 0.5 mg/ml – 1 ml
 - NaCl 0.9 % - 10 ml
 - Sprøyter og kanyler
- Sidedrypp med NaCl 0.9 %. Settes i gang 30 min. før kurstart – sakte infusjonstakt.
- **Premedikasjon:**
 - BT, puls, respirasjon og temp. måles før premedikasjon.
 - Medikamenter: Dexamethason, dexklorfeniramin og cimetidin. Hvert enkelt stoff settes som bolus over 3 min. i slangen på sidedryppet med NaCl.
- Tilgang på akuttkoffert.
- Lege på avdelingen må være informert om at Paclitaxel gis.

2. ADMINISTRERING.

- Det må benyttes PVC-frie infusjonsposser, infusjonssett samt filtre. Dette kommer fra apoteket. Vanlige 3-veis-kraner kan benyttes, men kun de aller korteste (uten forlengesslange).
- Oppstart av kur: Sidedryppet med NaCl stoppes, men blir hengende som beredskap ved evt. reaksjon.
- Pasienten observeres de første 30 min. av kur.
- BT, puls og respirasjon måles etter 15 min., 30 min., samt ved avslutning av kuren.
- Pasienten kan reise umiddelbart etter kur dersom alt har gått uten komplikasjoner.

3. VED HJEMREISE.

- Evt. parykkrekvisisjon.
- Evt. resept på smertestillende (Napren-E) dersom pasienten har hatt myalgi som følge av de foregående Paclitaxelkurene.