



## Docetaxel neoadjuvant og adjuvant

**Indikasjon:** 1. Neoadjuvant etter 4 EC90-kurer.  
2. Enkelte tilfeller adjuvant, vurder heller paclitaxel ukentlig mtp bivirkninger.

**Behandlingsplan:** 4 kurer gitt hver 3. uke

**Evaluering:** Neoadjuvant behandling: Kirurgi vurderes fortløpende ved dårlig respons.

### Administrering:

Stoff	Dose	Utblanding	Infusjonstid	Kurdag
Docetaxel #	100 mg/m <sup>2</sup>	250 ml NaCl	1 time	1
Lipegfilgrastim *	6 mg	SC		2

Eget infusjonsskjema: Se [her](#).

# Det gis dexametason 8 mg x 2 i tre døgn med oppstart 12 t. før kur. Se under.

\* H-resept

### Fra Nasjonalt handlingsprogram for brystkreft om G-CSF:

I tråd med EORTC retningslinjene for bruk av G-CSF anbefales G-CSF som primærprofylakse ved adjuvant behandling som gir minst 20% risiko for febrile neutropenier (det vil si EC90, docetaxel).

- Nederste akseptable grense for å gi kur er nøytrofile granulocytter  $1.0 \times 10^9/l$ .
- Ved verdier under 1.0 vil oftest kur kunne gis med tillegg av G-CSF. Er det grunner som taler i mot (meget lave neutrofile/usikkerhet om neutrofile granulocytter er stigende), vurderes pasienten på nytt etter 1-3 dager, med mål om å gi kur med tillegg av G-CSF
- Trombocytter: Vanligvis påvirkes ikke trombocytterne alvorlig. Ved raskt fall av verdier eller blødningstendens må en vurdere forlenget intervall eller dosereduksjon.

Prøvedag	Kritiske parametere	Grenser for full kur
1 (kurdag)	Nøytrofile	1,0 (Vurder allmenntilstand, se over)
	Trombocytter	50

**Blodprøvekontroll:** Hb, nøytrofile, trombocytter CRP på kurdagen.

## Anmerkninger:

### ♦ Docetaxel:

Hypersensitivitetsreaksjoner: Kan forekomme (eksem, kløe). I verste fall anafylaksi. Forebygges med dexametason som premedisinering 12 timer + 1 time før docetaxel-infusjon, og etter liste i 2 dager etterpå (se under). Akuttskrin skal være tilgjengelig inne hos pasienten. Lege skal være tilgjengelig.

Medikament	Dag -1	Dag 1 (kurdagen)	Dag 2	Dag 3
Dexametason	8 mg po om kvelden før kur	8 mg x 2 po	8 mg x 2 po	8 mg x 1 po

*Dersom pasienten ikke har tatt tabletter med dexametason som planlagt gis dexametason 16 mg i.v 30-60 minutt før kjemoterapi. De resterende fire orale doser gis på vanlig måte.*

Stomatitt: Forekommer ofte. Pas. bør informeres om godt munnstell. Vurder Hexidin og Xylocain viskøs ved symptomer. Evt. ledsagende soppinfeksjon behandles med Diflucan.

Nevropati: Ved alvorlige symptomer; kontakt onkolog. Vurder paclitaxel ukentlig.

Væskeretensjon: Kan være liten/ingen effekt av diuretika.

Hudreaksjoner som utslett, avskalling, sårhet forekommer hos mange (reversibel). Det anbefales nedkjøling av fingre (se eget skriv) og tær. Ved alvorlige symptomer; kontakt onkolog. Vurder paclitaxel ukentlig.

Diarre: Ved alvorlige symptomer; kontakt onkolog. Vurder paclitaxel ukentlig.

Hårtap: Ja. Parykkbehov.

Kvalme: Svak - moderat. Kvalmestillende: Metoklopramid p.o.

**Spørsmål kan rettes til Kreftavdelingen. tlf. 77 62 67 65**

**NB! Neste side – se skriv om bruk av kjølehansker**

## Ad. bruk av kjølehansker ved Taxotere-kurer

- Produsert av glycerininnholdende gel som holder elastisiteten også som dypfryst. Ytterste stoff er vanntett og elastisk.
- Kontraindikasjoner:
  - Raynards sykdom
  - Distale metastaser
  - Distal arterioinsuffiensi
  - Kuldeintoleranse
- Indikasjon:

Brukes på hender og føtter for å redusere bivirkninger fra hud/negler hos pasienter som behandles med Taxotere (se kurbeskrivelse).
- Gjennomføring:

Nedkjøling skal starte ca 15 min før Taxotere-infusjon og skal vare til 15 min etter avslutta infusjon. Bytt ut hanskene med et par nye etter halvgått infusjonstid.
- Hanskene skal brukes både på hender og føtter. Man kan alternativt bruke pose fylt med isbiter. (Vi har ikke så mange kjølehansker og disse er fryktelig dyre i innkjøp).
- Nedkjøling skal benyttes ved hver behandling for å beholde effektiviteten.
- Det brukes innerhansker/evt vanlige engangshansker som pas. skal bruke fra gang til gang inni kjølehanskene.
- Hanskene ligger i fryser nede på kreft poliklinikk (inntil videre). Avtal først med spl på poliklinikken (tlf. 26814)

April -07/MK