



## Carboplatin hver tredje uke ved trippel negativ metastatisk brystkreft eller ved kjent BRCA-mutasjon.

**Indikasjon:** Metastatisk brystkreft; trippel negativ eller ved kjent BRCA mutasjon.

**Behandlingsplan:** Carboplatin monoterapi hver tredje uke.

**Evaluering:** Hver 2-3 mnd.

### Administrering:

Stoff	Dose	Utblanding	Infusjonstid	Kurdag
Carboplatin	AUC 6 #	500 ml Glukose	1 time	Hver 3 uke

# Dose i mg =  $6 \times (\text{GFR} [\text{ml/min}] + 25)$ .

*Referanse: Tutt A, et al: The TNT trial. 2014 San Antonio Breast Cancer Symposium. Abstract S3-01. For uselekterte pasienter uten kjent BRCA status var objektiv respons 31,4% i carboplatin-armen. Ved kjent BRCA-mutasjon var respons-rate 68%.*

**Blodprøvekontroll:** Før hver kur: Hb, nøytrofile, trombocytter, kreatinin, CRP

**Nøytrofile skal være  $\geq 1,0$  før kur gis.**

Ved lavere verdier utsettes kuren noen dager og kreftlege kontaktes.

### Anmerkning:

**Carboplatin:** Elektrolyttap: Vanlig, spes. magnesium (og kalium). Tilskudd ved behov, fortrinnsvis Magnesium tyggetbl 120 mg x 3 daglig mellom kurene, ev. gis etterhydrering (glukose) tilsatt Magnesiumsulfat 10-20 mmol (+ ev. 20 mmol KCl).

Allergiske reaksjoner: Kan forekomme, risikoen øker med antall kurer som er gitt tidligere. Obs risiko for kryssallergi med cisplatin.

**Hårtap:** Ja, parykkbehov

### Mot kvalme:

Dag 1: Netupitant og palonosetron (Akynzeo): En tablett en time før kur.  
Dexametason 12 mg x 1

Dag 2-4: Dexametason 8 mg x 1

Evt tillegg av metoklopramid 10 mg x 3 ved behov.

**Spørsmål kan rettes til Kreftavdelingen, tlf. 77 62 67 65**