



Pertuzumab-Trastuzumab neoadjuvant kombinert med taxan ved HER2+ sykdom

- Indikasjon:** Neoadjuvant. HER2+ brystkreft etter EC90 kurer.
- Behandlingsplan:** Kur hver 3. uke. Totalt 12 ukers behandling.
- Evaluering:** Etter 6 uker.
- Forundersøkelser:** Bestemmelse av LVEF ved MUGA eller ekko. Det kreves en LVEF på 50 %. Denne us gjentas hver 12. uke. Se algoritme for vurdering EF under trastuzumab-behandling på NBCG.no.
- Kontraindikasjon:** Alvorlig hjertesykdom

FØRSTE KUR:

Stoff	Dose	Utblanding	Infusjonstid	Kurdag
Pertuzumab	840 mg	250 ml NaCl	60 min	1
Trastuzumab	600 mg	subcutant	2-5 min	2
+ taxan dag 2. Se eget kurskjema for paclitaxel eller docetaxel				

ANDRE KUR OG SENERE:

Stoff	Dose	Utblanding	Infusjonstid	Kurdag
Pertuzumab	420 mg	250 ml NaCl	60* min	1
Trastuzumab	600 mg	subcutant	2-5 min	1
+ taxan dag 1. Se eget kurskjema for paclitaxel eller docetaxel				

Eget infusjonsskjema: Se [her](#).

* Dersom *de to første infusjoner* pertuzumab forløper uten bivirkninger kan senere infusjoner og observasjonstid etter infusjon begge kortes ned til 30 min.

Anmerkning:

Pertuzumab: Infusjonsreaksjoner (feber, frysninger, utmattelse, hodepine, asteni, overfølsomhet, oppkast). Febril nøytropeni. Diarre (loperamid). Utslett. Venstre ventrikel dysfunksjon. Perifer nevropathi. Muskel kramper.

Hårtap: Ja. Parykkbehov.

Kvalme: Svak - moderat. Kvalmestillende: Afipran p.o.

Infusjonsrelaterte: Frostanfall, feber og influensalignende symptomer, smerter, stivhet, hoste, kvalme og brekninger. Ved infusjonsrelaterte bivirkninger må infusjonen stoppes og lege tilkalles. Pasienten overvåkes til symptomene opphører og inf. kan fortsette.

Kardialt: Takyarytmi, hjertesvikt, kardiomyopati.

Gastrointestinalt: Diaré, obstipasjon, magesmerter, kvalme, levertoksisitet

Anemi og nøytropeni

Spørsmål kan rettes til Kreftpoliklinikken, tlf. 77 62 68 14