

Indikasjon: Lokalavansert eller metastatisk NSCLC hos pasienter med PD-L1-uttrykk $\geq 1\%$ og ECOG 0-1 etter tidligere kjemoterapi eller målstyrt behandling.

Behandlingsplan: Kur hver 3. uke inntil progresjon eller uakseptabel toksisitet.

Evaluering: Klinisk før hver kur. CT etter 4 kurer, videre etter hver 3. kur.

Pasienten observeres i 30 min etter kurene.

Medikament	Dose	Kurdag
Atezolizumab	1200 mg (fast dose)	1

Blodprøver før kur: Hb, hvite med diff, trc, Na, ion-Ca, K, Kr, ASAT, ALAT, ALP, gGT, glukose, bilirubin, LD, TSH/FT4 (ACTH/kortisol tas før oppstart og etter hver 2. kur).

Bivirkninger: Bivirkninger kan være av immunologisk karakter og inkluderer bla. pneumonitt, hepatitt, kolitt, hypofysitt, hypo/hypertyreose, pankreatitt, hudreaksjoner og infusjonsreaksjoner.

Bivirkningene behandles etter retningslinjer, se Docmap prosedyre [RL3758](#).

Pasientene skal oppfordres til å ta kontakt med lege dersom de opplever endringer i helsetilstanden i perioden de får Atezolizumab. Det er viktig å fange opp symptomer på immunologiske bivirkninger tidlig, da de kan bli alvorlige om de får utvikle seg. Fastlege og leger ved lokalsykehus skal informeres, gjerne ved bruk av frasen til dette formål.

Pasientene ringes derfor av kreftsykepleier ca. dag 10 etter hver kur med tanke på å avdekke bivirkninger: Spør generelt om pasientens helsetilstand. Deretter spesielt om hud (utslett/kløe), mage og lever (diare/magesmerter) samt lunger (tungpust/hoste). Alle endringer i helsetilstand skal diskuteres med lege på avdelingen.

Pasienten skal utstyres med pasientkort med informasjon om medikamentet og telefonnummer som skal benyttes dersom pasienten opplever bivirkninger/er kontakt med helsevesenet.

Spørsmål rettes til lungeavdelingen, tlf. 776 28073

Atezolizumab

Pasient:

Lege:

Dato:

Fdato:

Spl:

Kur nr:

NB! Det skal benyttes infusjonssett med in-line-filter

Medikamenter	Infusjonstid	Start kl	Sign.
<u>Hydrering:</u> 100 ml 0.9% NaCl	Ca 50 ml før kur, resten etterpå		
Atezolizumab 1200 mg i 250 ml 0.9% NaCl	1. kur: 60 min videre kurer: 30 min		

Blodtrykk og puls måles før infusjon og etter 30 min, ellers ved behov.

	Kl.slett	BT	Puls
Før infusjon			
30 min.			

Sjekket backflow:

Sjekket kur mot pasient:

Bivirkninger:

Ø-hjelp skrin skal være tilgjengelig under infusjon.

Anafylaktiske eller andre overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme (feber, kløe, hypotensjon, pustebesvær, kvalme, oppkast, frysninger, uvelhet, muskelverk). Dersom bivirkninger stopp infusjon og kontakt lege.