

TUMORLYSEPROFYLAKSE -SCLC

INDIKASJON: Opptart behandling av SCLC med store tumormasser. Aktuelt ved både kurativ og palliativ behandling.

BLODPRØVER (DAG 0 - 3):

Kreatinin, Bilirubin, ASAT, ALAT, LDH, Gamma GT, Kalium, Natrium, Fosfat, Ionisert calcium, Urinsyre + evt.

- Sykepleier bestiller blodprøvene på Dips, ligger som egen gruppe kalt Tumorlyse under "Analysegrupper" .

ZYLORIC (ALLOPURINOL):

Gis som profylakse mot urinsyre-nefropati

- Lege ordinerer i hvert enkelt tilfelle.
- Vanlig dosering: 200 mg x 3 peroralt. Lege fører på kurven.
- Pas. skal stå på dette fram til neste kur (seponeres da dersom legen ikke bestemmer annet).

HYDRERING:

Første dag av tumorlyseprofylaksen = dag 0 (primært dagen før kur gis). Det skal måles drikke/diurese.

Inntak: Ca. 4000 ml/døgn (til sammen iv + drikke) i minst 3 dager. Lege bestemmer hvilken dag hydrering skal avsluttes (kan variere).

Dag 1 og 2 kan pasienten drikke hele mengden. Avtal med pasienten hvor mye han tror han kommer til å drikke. Gi evt. iv. væske i tillegg.

NB! Tumorlyseprofylaksen kontinueres inntil lege bestemmer at det ikke er nødvendig lenger.

Tumorlyseprofylakse:

Hydrering	Infusjonstid	Dag 0	Dag 1	Dag 2	Dag 3
NaCl 0.9% 1000 ml					
NaCl 0.9% 1000 ml					
Ringer 1000 ml					

MÅLING AV DIURESE:

- Diuresen bør være tilfredsstillende ved kurstart (> 400 ml/4t). Mål urin fra morgenen dag 0.
- Hvis lavere diurese, gi 10-20 mg Furosemid iv.

1. KI/dato	Dag 0	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4
07 - 11					
11 - 15					
15 - 19					
19 - 23					
23 - 03					
03 - 07					
Vekt x 2 Vekt nr:					
Furix iv. gitt ved behov					