

Infliksimab (Remicade, Remsima)

- en pasientinformasjon

Hvordan virker Infliksimab?

Infliksimab reduserer betennelsesreaksjonen ved psoriasis og psoriasisleddgikt ved å binde seg til tumor-nekrose faktor (TNF-alfa). Virkningen ved psoriasis kommer vanligvis i løpet av 4 uker.

Hvordan brukes Infliksimab?

Infliksimab gis intravenøst (infusjon inn i blodåre) hver 8. uke (til å starte med noe hyppigere).

Har Infliksimab bivirkninger?

Reaksjoner i forbindelse med infusjonen, bl.a. utslett og kløe og allergiske reaksjoner kan forekomme. Infliksimab virker inn på immunforsvaret og luftveisinfeksjoner som bihulebetennelse, bronkitt og ev. lungebetennelse kan forekomme. Dersom en har mistanke om infeksjon, skal en ikke ha ny infusjon før infeksjonen er behandlet eller gått over av seg selv. Noen pasienter bemerker også hodepine. Ved uforklarlig feber, tegn på blødning i huden (blåflekker) eller neseblødning skal du si fra til legen. Infliksimab er ennå å betrakte som et relativt nytt legemiddel, og bivirkninger ved lengre tids bruk ikke klarlagt. Det er derfor usikkert om behandling med Infliksimab kan påvirke utviklingen av kreftsykdommer eller andre sykdommer.

Hvem skal ikke ta Infliksimab?

Gravide. Behandling med Infliksimab bør avsluttes minst 6 måneder før ønsket svangerskap. Ammende. Personer med alvorlig hjertesvikt. Personer som har kreftsykdom eller har vært behandlet for dette de siste 5 år (unntak: enkelte former for hudkreft). Infliksimab skal ikke brukes ved allergi mot muse-protein. Personer med multippel sklerose.

Ved infeksjon skal behandlingen vente til feber og andre infeksjonstegn har gitt seg. Dersom det er planlagt en operasjon, avgjør legen hvor lang pause du evt. skal ha i Infliksimab - behandlingen før og etter operasjonen.

Infliksimab og andre medikamenter

Skal ikke brukes sammen med Kineret (Anakinra). Medikamentet kombineres ofte med Methotrexate. Det anbefales at man unngår levende vaksiner, influensavaksinen er ikke-levende og kan brukes.

Hvordan skal behandling kontrolleres?

Det tas blodprøver og urinprøve før oppstart. Deretter blodprøver og urinprøve ved hver ny infusjon.