



FLIRI (FLV + Campto)

Indikasjon: Metastatisk Kolorectalcancer

Behandlingsplan: Ny kur hver 2. uke

Evaluering: Før hver 5. kur

Administrering:

Stoff	Dose mg/m ²	Utblanding	Infusjonstid	Kurdag
Campto (Irinotecan)	180 mg/m ²	250 ml NaCl	1 time	1
5-FU	500 mg/m ²	50 ml NaCl	< 5 min	1 og 2
20 – 30 min pause mellom 5FU og Kalsiumfolinat. Gi 500ml NaCl 9mg/ml				
Kalsiumfolinat	100mg (enkeldose)	100 ml NaCl	5-10 min	1 og 2

Eget infusjonsskjema: Se [her](#).

Atropin 0,5 mg gis subcutant før Campto-infusjonen for å forebygge kolinergt syndrom.

Hematologisk toksisitet. Verdier ved tid for neste kur;

Neutrofile	Trombocytter	Medikamentdoser	
		Campto	5FU
≥ 1,5	≥ 100	180 mg/m ²	500 mg/m ²
1,0 - 1,5	75 - 100	Utsett og 145 mg/m ²	Utsett og 400 mg/m ²

Ved lavere verdier – utsett kur til tilfredstillende verdier og dosereduser som over. Ved fortsatt problemer 115 mg/m² Campto og 300 mg/m² 5FU. Ytterligere dosereduksjon er ikke hensiktsmessig og kuren må seponeres. Ved palliative kurer kan man utvise et visst skjønn når det gjelder å velge mellom dosereduksjon, utsettelse eller å øke intervallene

Blodprøver før første kur og senere hver 2. kur: Hb, hvite, neutrofile, trombocytter, kreatinin.

Blodprøver før hver kur: Hb, hvite, neutrofile, trombocytter.

Bivirkninger**GI-toxisitet:**

Ved diarre og mucositt grad ≥ 2 ; utsettes kur til oppnådd grad 1 og dosereduser som ved hematologisk toxisitet. Vær obs på dehydrering.

Akutt kolinergt syndrom (Irinotecan):

Symptomer: Svette, magesmerter, økt spytt-sekresjon, tåreflod, synsforstyrrelser. Kan oppstå i løpet av Campto-infusjonen og umiddelbart etterpå. Kort varighet og er aldri livstruende.

For å forbygge dette gir vi Atropin 0,5 mg sc før kur.

Diarè/sendiarè (Irinotecan):

Vanligvis oppstår diarèen ca. 5 dager etter kur, og varer gjennomsnittlig i ca. 1-2 dager. Kan bli svært alvorlig dersom den ikke behandles med medikamenter.

Behandling av diarè: Ved første løse avføring tas 2 tbl. Imodium og deretter 1 tbl. hver 2. time i minst 12 timer, og uansett fortsette i 12 timer etter siste løse avføring. Dersom diarèen varer > 24 timer, skal avdelingen kontaktes. Imodium skal ikke tas i mer enn 48 timer. Ved diarè som varer mer enn 24 timer, vil legen vurdere om pasienten skal behandles med antibiotika tbl. (Ciproxin).

Kvalme:

Kvalmeprofylakse:

Dag 1: Zofran 8 mg x 2 iv/po + Fortecortin 16 mg x 1 iv/po

Dag 2: Zofran 8 mg x 2 peroralt.

Hårtap:

Ja, parykk-behov

Spørsmål kan rettes til Kreftavdelingen, tlf. 77 62 67 65