



FLV

- Indikasjon:** Metastatisk COLOREKTAL CANCER.
Adjuvant beh. av CA. COLI, > 75 år
- Behandlingsplan:** **Metastatisk:** 2 dagers kur hver 2. uke t.o.m. 8. kur. Deretter hver 3. uke inntil progresjon.
Adjuvant: 2 dagers kur hver 2. uke - totalt i 6 måneder.
- Evaluering:** Før 5. og 9. kur. Videre hver 3. måned ved metastatisk sykdom.
- Spesielle forundersøkelser:** Ingen.

Administrering:

Stoff	Dose	Utblanding	Infusjonstid	Kurdag
5FU	500 mg/m ²	50 ml NaCl	3 - 5 min	1 og 2
20 - 30 min infusjon med 100 ml NaCl 9 mg/ml				
Kalsiumfolinat	100 mg (enkeldose)	50 ml NaCl	5 min	1 og 2

NB! Kalsiumfolinat gis 30 min. etter oppstart av 5FU.

Eget infusjonsskjema: Se [her](#).

Dosejusteringsskjema: Blodverdier ved tid for ny kur

Neutrofile	Trombocytter	Stoffene - % av vanlig dose	
		5FU	Leukovorin
≥ 1.5	≥ 100	500 mg/m ²	100
1.0 - 1.5	75 - 100	Utsett og 400 mg/m ²	100

Ved lavere verdier – utsett kur til tilfredstillende verdier og dosereduser som over.
50 % kur har sannsynligvis ingen hensikt, men kan prøves.

Ved adjuvante kurer er hensikten kurativ og man skal unngå å doseredusere og utsette kurer. Vurder å bruke G-CSF.

Blodprøvekontroll: Ikke nødvendig mellom kurene.

Anmerkning:

- ♦ **5FU:** - OBS! Gastrointestinale bivirkninger som diaré, mucositt.
- ♦ **Hårtap:** - Nei.
- ♦ **Kvalme:** - Svak. Kvalmestillende: Afipran p.o.

Spørsmål kan rettes til Kreftavdelingen, tlf. 77 62 67 65