



S1 / Teysuno®

Indikasjon: Ventrikkeltumor. Kolorektaltumor.

Behandlingsplan: Ny kur hver 3. uke. Evaluering etter hver 3. kur.

Administrering:

Stoff	Dose	Utblanding	Kurdag
S1 (tegafur) Teysono®	30 mg/m ² per dose (60 mg/m ² per døgn)	Tabletter to ganger daglig.	1–14

Kvalmeforebyggende regime

Metoklopramid 10 mg ved behov inntil x 3

Dosejusteringer

Ved behov reduseres S1 med 5 mg/m² (ikke < 15 mg/m²).

Hematologisk toksisitet: Ved nøytrofile < 1,5 eller trombocytter < 100 utsettes kur.

Grad	Dag 1	Øvrig tid i syklus	
Nøytropeni 1–3	N 0,5–1,5	Utsett til N ≥ 1,5	Ingen endring
Nøytropeni 4 eller febril nøytropeni	N < 0,5	Utsett til N ≥ 1,5. Reduser dose (ev. GCF).	Utsett til N ≥ 1,5. Reduser dose (ev. GCF).
Trombopeni 1–2	Trc 50–99	Utsett til T ≥ 100	Ingen endring
Trombopeni 3–4	Trc < 50	Utsett til T ≥ 100. Reduser dose.	Utsett til T ≥ 100. Reduser dose.

Andre toksisiteter:

Grad	Dag 1	Øvrig tid i syklus
2 (unntatt kvalme, oppkast, hårtap)	Utsett til grad 0–1	Ingen endring
3-4 (unntatt kvalme 3)	Utsett til grad 0–1 og reduser dose.	Utsett til grad 0–1 og reduser dose.

Nyresvikt: Ved GFR < 30 stoppes behandling. Ved GFR < 50 dosereduksjon.

Bivirkninger: Anoreksi, fatigue, kvalme, diaré.

Spørsmål kan rettes til Kreftpoliklinikken (tlf 77 62 68 14) eller Kreftavdelingen (tlf 77 62 67 65).

PASIENTINFORMASJON TEYSUNO

Denne kuren består av Teysuno-tabletter (S1) som omdannes til cellegift (5FU) i kroppen. Tablettene tas to ganger daglig i 2 uker, deretter er det en uke uten behandling før du starter ny runde dersom formen og blodprøvene (må tas før hver kur) er tilfredsstillende.

Teysuno

- Tas minst 1 time før eller etter måltid. Svelges hele.
- Ikke erstatt dose du glemmer eller eventuelt kaster opp, men vent til neste tidspunkt
- Tas morgen og kveld til noenlunde samme tidspunkt
- Dersom du blir kvalm, kan du ta Afipran (metoklopramid) 10 mg, 1 tabl ved behov inntil 3 ganger daglig.

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Morgen														
Kveld														

Redusert beinmargsfunksjon

NB! Kuren kan medføre lavt antall hvite blodceller pga. forbigående nedsatt produksjon i beinmargen, noe som gir økt risiko for infeksjon. **Hvis du får feber >38,5 eller plutselig uvelhet og redusert allmenntilstand, må du straks ta kontakt** med lege(vakt) eller oss (om det så er midt på natta). Forsøk å leve et mest mulig normalt liv, men hvis mulig unngå nærkontakt med mennesker du vet har en infeksjon. Vær nøye med hygien.

Det kan også oppstå neseblødning og hudblødninger (pga. lavt antall blodplater), samt blodfattighet (pga. lav blodprosent).

Andre bivirkninger

Tåles vanligvis godt. Noen blir slappere, opplever kvalme, får redusert matlyst og går ned i vekt. Du kan få diaré, bruk i såfall Loperamid ved behov. Kan gi tørre og såre slimhinner i øyne, munn/svelg og underliv. Noen kan oppleve at huden på hender og føtter blir øm og skjør, huden kan flasse av, bruk fuktighetskrem. Ta eventuelle plager opp med oss.

Kontakt oss gjerne dersom du lurer på noe:

- Kreftpoliklinikken tlf. 77 62 68 14
- Kreftavdelingens sengepost tlf. 77 62 67 65