



ELF

- Indikasjon:** Metastatisk VENTRIKKEL-CANCER
- Behandlingsplan:** Kur hver 3. uke inntil progresjon eller uakseptabel toksisitet
- Evaluering:** Etter hver 3. kur.

Administrering:

Stoff	Dose	Utblanding	Infusjonstid	Kurdag
Etoposid	120 mg/m ²	500 ml NaCl	50 min	1 - 3
Kalsium-folinat	60 mg/m ²	50 ml NaCl	10 min	1 - 3
5FU	500 mg/m ²	50 ml NaCl	5 min	1 - 3

Eget arbeidsskjema: Se [her](#).

Dosejusteringsskjema:

Neutrofile	Trombocytter	Stoffene i % av vanlig dose		
		Etoposid	Leukovorin	5FU
≥ 1.5	≥ 100	100	100	100
1.0 – 1.5	75 - 100	75	100	75
< 1.5	< 75	Utsett kuren til tilfredstillende verdier		

Blodprøvekontroll: Hb, neutrofile, hvite, trombocytter dag 10 - 12.

Anmerkning:

- ♦ **5FU:** - **OBS!** Gastrointestinale bivirkninger som mucositt, diaré.
- **Etoposid:** - Kan gi anafylaktoid reaksjon. Reaksjon inntreffer som regel innen de første 10 minuttene av første infusjon. Ved 1. infusjon skal akuttskrinet være i umiddelbar nærhet. Ved reaksjon, stoppes infusjonen straks. Evt. andre tiltak avhenger av reaksjonen.
- ♦ **Hårtap:** - Ja. Parykkbehov.
- ♦ **Kvalme:** - Moderat. Kvalmestillende: Serotoninantagonist iv/po.

Spørsmål kan rettes til Kreftavdelingen, tlf. 77 62 67 65