



CiFu (øsofagus, NeoRes)

- Indikasjon:** Ca øsofagus (operabel) med kurativt siktemål.
- Behandlingsplan:** Følger NeoRes-protokollen. Tre kurer før kirurgi, oppstart hver 3. uke.
- Spesielle forundersøkelser:** Kreatininclearance (beregnet) > 60 ml/min. EKG. Audiometri.

Administrering:

Stoff	Dose	Utblanding	Infusjonstid	Kurdag
Cisplatin	100 mg/m ²	1000 ml NaCl 9 mg/ml	4 timer	1
Fluorouracil (5-FU)	750 mg/m ²	100 ml NaCl i kassett på CADD-pumpe eller 2000 ml NaCl 9 mg/ml på infusjonspumpe (brukes ved flebitt)	24 timer	1–5

GCF (pegfilgrastim 6 mg x 1) dagen etter kur.

Eget arbeidsskjema: Se [her](#).

Dosejusteringsskjema:

Neutrofile	Trombocytter	Cisplatin	5FU
≥ 1.0	≥ 75	100 %	100 %
< 1.0	< 75	Utsett og 75 %	Utsett og gis kun dag 1–3

Ved svært lave nadirverdier vurderes dosereduksjon.

Blodprøvekontroll: Hb, hvite, trc, CRP dag 10–12 etter kur. Hb, hvite, trc, CRP, kreatinin før kur.

Anmerkning:

Cisplatin: Nyretoksisk! God hydrering nødvendig. Oppretthold adekvat diurese (se arbeidsskjema). Unngå nyretoksiske medikamenter inntil 1 md. etter cisplatinbehandling (f.eks. aminoglykosider). Ototoksisk. Ved GFR <50 eller kreatinin >130, erstattes cisplatin med karboplatin (AUC 5) ved plateepitel- karsinom eller oksaliplatin (130 mg/m²) ved adenokarsinom. Samme gjelder ved hørselsskade.

5Fu: OBS! Gastrointestinale bivirkninger som diaré, mukositt.

Pasientene blir ofte sår i munnslimhinnen. Bør informeres om viktigheten av godt munnstell. Foreskriv Dusseldorf-blanding og Xylocain viskøs ved behov.

Hårtap: Ja. Parykkbehov.

Kvalme: Høyemetogen.

	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5
Aprepitant	125 mg po	80 mg po	80 mg po		
Palonosetron	250 µg iv				
Metoklopramid			10 mg x 3 po	10 mg x 3 po	10 mg x 3 po
Deksametason	12 mg po/iv				
Prednisolon		40 mg x1 po	40 mg x1 po	40 mg x1 po	40 mg x1 po

Spørsmål kan rettes til Kreftavdelingen, tlf. 77 62 67 65