



PACLITAXEL + KARBOPLATIN

Indikasjon: Øsofaguscancer. Neoadjuvant behandling kombinert med stråleterapi 1,8 Gy x 23 for resektabel cancer.

Behandlingsplan: Ukentlig kur dag 1, 8, 15, 22 og 29 (totalt 5).
Kirurgi 4-6 uker etter RT.

Før kur: Cr-EDTA-clearance før oppstart, videre estimert GFR.
Ukorrigert GFR-verdi (ml/min) skal benyttes. (AUC 2).

Administrering:

Stoff	Dose	Utblanding	Infusjonstid	Kurdag
Paclitaxel	50 mg/m ²	250 ml NaCl	1 time	1
Karboplatin	2 x (GFR (ml/min) + 25)	250 ml Glukose 50 mg/ml	30 min	1

Eget arbeidsskjema: Se [her](#)

Krav før kur:

Nøytrofile $\geq 1,0$ og trombocytter ≥ 75 og GFR > 20 .

Ved nøytrofile $< 1,0$ eller trombocytter < 75 utsettes kur 1 uke, ingen doseendring.

Premedikasjon:

Deksamaton 8 mg iv, 4 mg fra 3. kur

Deksklorfeniramin 5 mg iv

Ranitidin 50 mg iv

Ondansetron 8 mg

Bivirkninger

Anafylaksi (paclitaxel):

Åndenød, hypotensjon, urtikaria. Stopp infusjon umiddelbart. Vurder ekstra dose antihistaminer, steroider, adrenalin og ev. andre akuttmedisinske tiltak.

Akuttskrin og lege skal være tilgjengelig før paclitaxel gis.

Redusert beinmargsfunksjon og febril nøytropeni

Muskel-ledd-smerter (paclitaxel): Oftest 2-3 dager etter kur.

Polyneuropati

Diaré eller forstoppelse

Stomatitt / mukositt

Hårtap: Ja, hos noen. Kan da tilbys parykk / hodeplagg.

Kvalme: Moderat. Serotoninantagonist dag 1.

Spørsmål kan rettes til Kreftpoliklinikken, tlf. 77 62 68 14