



FuMi-Anal

Indikasjon: Gis i kombinasjon med strålebehandling mot ANALCANCER (plateepitelcarcinom), T1-2 og N0 M0
Kan også gis ved metastatisk sykdom i enkelte tilfeller.

Behandlingsplan: 4 døgns kur som gis ved oppstart av strålebehandling.
Mitomycin skal være gitt og 5FU-infusjonen skal være i gang før strålefraksjonen gis.

Spesielle forundersøkelser: Ingen.

Administrering:

Stoff	Dose	Utblanding	Infusjonstid	Kurtdag
Mitomycin-C	10 mg/m ²	100 ml NaCl	30 min	1
5FU	1000 mg/m ²	100 ml NaCl i kassett på Pharmaciapumpe *	24 timer	1 - 4

* Ved flebittprobl., kan 5FU gis som kontinuerlig infusjon i 2000 NaCl/døgn (Infusjons-pumpe).

Eget infusjonsskjema: Se [her](#).

Max kumulativ dose: Mitomycin-C 100 mg totalt.

Dosejusteringskjema:

Neutrofile	Trombocytter	Medikament-dose	
		Mitomycin-C	5FU
≥ 1.5	≥ 100	10 mg/m ²	1000 mg/m ² /24t
< 1.5	< 100	Utsett kuren til tilfredstillende verdier	

Anmerkning:

- ♦ **Mitomycin-C:**
 - **Vevstoksisk!** Unngå ekstravasering. (Is ved ekstravasal infusjon).
 - OBS! Forsinket benmargsdepresjon. (Nadir ved ca. dag 20 - 42).
- ♦ **5FU:**
 - OBS! Gastrointestinale bivirkninger som diaré, mucositt.
 - Pasientene blir ofte sår i munnslimhinnen. Bør informeres om viktigheten av godt munnstell. Send med Xylocain viskøs ved utreise.
- ♦ **Hårtap:**
 - Ja. Parykkbehov.
- ♦ **Kvalme:**
 - Moderat.
 - Kvalmestillende: Dexametason 4-8 mg x 2
Serotoninantagonist 1. dag, evt. 2. dag.
Afipran p.o. x 3 dgl. fra 2. døgn.

Spørsmål kan rettes til Kreftavdelingen, tlf. 77 62 67 65