



## MITOMYCIN-C + 5FU

**Indikasjon:** ANALCANCER (plateepitelcarcinom) uten metastaser, d.v.s. fjernmetastaser, lymfeknutemetastaser. Gis i kombinasjon med strålebehandling.  
Kan evt. også gis ved metastatisk sykdom i enkelte tilfeller.  
Metastatisk PENISCANCER.

**Behandlingsplan:** 4 døgns kur som gis ved oppstart av strålebehandling.

**Spesielle forundersøkelser:** Ingen.

### Administrering:

Stoff	Dose	Utblanding	Infusjonstid	Kurdag
Mitomycin-C	10 mg/m <sup>2</sup>	100 ml NaCl	30 min	1
5FU	1000 mg/m <sup>2</sup>	100 ml NaCl i kassett på Pharmaciapumpe *	24 timer	1 - 4

\* Ved flebittprobl., kan 5FU gis som kontinuerlig infusjon i 2000 NaCl/døgn (Infusjons-pumpe).

**Eget infusjonsskjema:** Se [her](#).

**Max kumulativ dose:** Mitomycin-C 100 mg totalt.

### Dosejusteringsskjema:

Hvite bl.l.	Trombocytter	Stoffene - % av vanlig dose	
		Mitomycin-C	5FU
≥ 3.0	≥ 100	100	100
2.5 - 2.9	75 - 99	75	75
2.0 - 2.4	50 - 74	50	50
< 2.0	< 50	Utsett kuren 1 uke	

### Anmerkning:

- ♦ **Mitomycin-C:**
  - **Vevstoksisk!** Unngå ekstravasering. (Is ved ekstravasal infusjon).
  - OBS! Forsinket benmargsdepresjon. (Nadir ved ca. dag 20 - 42).
- ♦ **5FU:**
  - OBS! Gastrointestinale bivirkninger som diaré, mucositt.
  - Pasientene blir ofte sår i munnslihinnen. Bør informeres om viktigheten av godt munnstell. Send med Xylocain viskøs ved utreise.
- ♦ **Hårtap:**
  - Ja. Parykkbehov.
- ♦ **Kvalme:**
  - Moderat.
  - Kvalmestillende: Serotoninantagonist 1. dag, evt. 2. dag.  
Afipran p.o. x 3 dgl. fra 2. døgn.