



## PACLITAXEL (TAXOL®)

**Indikasjon:** Metastatisk Analcancer

**Behandlingsplan:** Kur hver 3. uke.

**Evaluering:** Ved hver 2- 3 kur

### Administrering:

Stoff	Dose	Utblanding	Infusjonstid	Kurdag
Paclitaxel	175mg/m <sup>2</sup>	500 ml NaCl	3 time	1

Eget infusjonsskjema: Se [her](#).

### Dosejustering :

		Stoffene i % av vanlig dose
Nøytofile	Trombocytter	Paclitaxel
≥ 1.0	≥ 100	100
< 1.0	< 100	Utsett kuren 1 uke

**Blodprøvekontroll før hver kur:** Hb, nøytrofile, trombocytter, CRP

### Anmerkning:

- ♦ **Paclitaxel:**
  - Hypersensitivitetsreaksjoner kan forekomme (eksem, kløe). I verste fall anafylaksi, spesielt ved 1. eller 2. kur. Forebygges med Dexametason tabl 20 mg som premedisinering kvelden og morgenen før paclitaxel infusjon. Videre 8 mg x 1 dag 2 og 3. Akutt-skrin skal være tilgjengelig inne hos pasienten.
  - Stomatitt kan forekomme. Pas. bør informeres om godt munnstell.
  - Kan gi nevropatisyntomer.
  - Forbigående væskeretensjon. Liten/ingen effekt av diuretika.
  - Hudreaksjoner som utslett forekommer (reversibel).
  - Muskel- og leddsmerter 2 – 3 dager etter infusjon. Kan lindres med paracetamol, event. antiflogistika.

*Sykepleier skal sitte hos pasienten under infusjonen.*

♦ **Hårtap:** - Ja. Parykkbehov.

♦ **Kvalme:** - Svak - moderat. Kvalmestillende: Afipran p.o.

**Spørsmål kan rettes til Kreftpoliklinikken. tlf. 77 62 68 14**