

 <b>Universitetssykehuset</b> Nord-Norge  <b>Kreftavdelingen</b>	<b>Caelyx</b>	Barkode	Utarbeidet: 11/07 MK Revidert 03/14 Ark nr: 1 av 1
	<b>Metastatisk ca mammae</b>		

**NB! Fyll alltid iv.-settet med Glukose 5 % (ikke NaCl)!!**

**Dato/årstall:**

Stoff	Infusjonstid	Kl.slett	Sign.
<b>Kvalmeregime:</b> Odansetron 8 mg morgen og kveld	P.o		
<b>Caelyx:</b> Doser < 90 mg: i 250 ml Glukose 5 % Doser > 90 mg: i 500 ml Glukose 5 %	1.kur: 90 min. 2. kur og videre: 60 min.		

**Obs reaksjoner som flushing, hjertebank, pusteproblemer (se kurbeskrivelsen):**

- Det er ikke nødvendig å monitorere pasienten med BT/p-målinger underveis. Men dersom reaksjoner oppstår, skal infusjonen stoppes til symptomene gir seg. Start deretter infusjonen med roligere infusjonstakt.
- Bruk 3-veis kran på iv-settet (i tilfelle reaksjoner)

**Husk pasientinformasjon (se kurbeskrivelsen).**