

 Universitetssykehuset Nord-Norge Kreftavdelingen	Herceptin 1. kur	Barkode	Utarbeidet: 01/07 Revidert 03/14 Ark nr: MK
	Ca. mammae		

Se eget skjema for de neste kurene (fra kur nr. 2..).

Dag 1, dato:

Premedisinering før Herceptin	Tidspunkt	Kl.	Sign.
Paracetamol 1 g peroralt	30 min. før Herceptin		
Versal 10 mg peroralt	30 min. før Herceptin		

Medikament	Infusjonstid	Start kl.	Sign.
Prehydrering: 500 ml NaCl 0.9%	30 min.		
Herceptin i 250 ml NaCl 0.9%	90 min.		
Posthydrering: 500 ml NaCl 0.9%	30 min.		

Observasjoner ifm. Herceptin (i tils. 6 timer): Anafylaksiberedskap skal alltid være tilgjengelig!

	Kl.slett	BT	Puls	Temp.	Resp.	Sign.
Før kurstart						
Etter 30 min.						
Etter 60 min.						
Etter 90 min						
2 timer						
3 timer						
4 timer						

- Herceptin er ikke vevstoksisk eller giftig, men kan gi allergiske reaksjoner (se kurbeskrivelse).
- Ved bivirkninger skal infusjonene stoppes øyeblikkelig. Den kan starte igjen med 50% hastighet når symptomene har forsvunnet.
- Ved ytterligere reaksjon, reduseres dosen til 25%