

 Universitetssykehuset Nord-Norge  Kreftavdelingen	<b>Herceptin</b>  <b>2. kur og videre</b>	Barkode	Utarbeidet: 01/07 Revidert 03/14 Ark nr: MK
--	---	---------	---

**Dag 1, dato:**

Premedisinering før Herceptin	Tidspunkt	Kl.	Sign.
Paracetamol 1 g peroralt	30 min. før Herceptin		
Versal 10 mg peroralt	30 min. før Herceptin		

Medikament	Infusjonstid	Start kl.	Sign.
<b>Prehydrering:</b> 500 ml NaCl 0.9%	30 min.		
<b>Herceptin</b> i 250 ml NaCl 0.9%	30 min.*		
<b>Posthydrering:</b> 500 ml NaCl 0.9%	30 min.		

\* Infusjonen gis på 30 min dersom startdosen (1. kur) ble godt tolerert.

**Observasjoner ifm. Herceptin (observere pas. i 2 timer etter avsluttet kur):**

Anafylaksiberedskap skal alltid være tilgjengelig!

	Kl.slett	BT	Puls	Temp.	Resp.	Sign.
Før kurstart						
Etter 30 min.						
Etter 60 min.						
Etter 90 min						
Etter 2 timer						

**Dersom ingen komplikasjoner de første 6 kurene, er det tilstrekkelig å måle BT/puls kun før og etter kur.**

- Herceptin er ikke vevstoksisk eller giftig, men kan gi allergiske reaksjoner (se kurbeskrivelse).
- Ved bivirkninger skal infusjonene stoppes øyeblikkelig. Den kan starte igjen med 50% hastighet når symptomene har forsvunnet.
- Ved ytterligere reaksjon, reduseres dosen til 25%