

 Universitetssykehuset Nord-Norge Kreftavdelingen	Herceptin + Taxol 1. kur	Barkode	Utarbeidet: Revidert 03/14 Ark nr:
	Ca. mammae		

Dag 1: Herceptin-infusjon

Dag 2: Taxol-infusjon.

Se eget skjema for kur nr.2

Se eget skjema for kur nr. 3 og videre..

Dag 1, dato:

Premedisinering før Herceptin	Tidspunkt	Kl.	Sign.
Paracet 1 g peroralt	30 min. før Herceptin		
Versal 10 mg peroralt	30 min. før Herceptin		

Medikament	Infusjonstid	Start kl.	Sign.
Prehydrering: 500 ml NaCl 0.9%	30 min.		
Herceptin i 250 ml NaCl 0.9%	90 min.		
Posthydrering: 500 ml NaCl 0.9%	30 min.		

Observasjoner ifm. Herceptin (i tils. 6 timer): Anafylaksiberedskap skal alltid være tilgjengelig!

	Kl.slett	BT	Puls	Temp.	Resp.	Sign.
Før kurstart						
Etter 30 min.						
Etter 60 min.						
Etter 90 min						
2 time..						
3 timer						
4 timer						

- Herceptin er ikke vevstoksisk eller giftig, men kan gi allergiske reaksjoner (se kurbeskrivelse).
- Ved bivirkninger skal infusjonene stoppes øyeblikkelig. Den kan starte igjen med 50% hastighet når symptomene har forsvunnet.
- Etterskyl med 100 ml NaCl 0.9%.
- Ved ytterligere reaksjon, reduseres dosen til 25%.

Kur dag 2: Se neste side..

DAG 2; dato:

Premedisinering/hydrering før Taxol	Infusjonstid	Kl.slett	Sign.
Prehydrering: 500 ml NaCl 0.9%	30 min		
- Dexametason 8 mg iv.	30 min. før kur	Bolus	
- Deksklorfeniramin 5 mg iv.	30 min. før kur	Bolus	
- Zantac 50 mg iv.	30 min. før kur	Bolus	

NB! Alle medikamentene settes fortløpende i inj.stussen på hydr.dryppet med NaCl.

Cytostatika	Infusjonstid	Kl.slett	Sign.
Taxol i 250 ml NaCl 0.9%	1 time		
Posthydrering: 500 ml NaCl 0.9%	30 min.		

NB! Taxol skal infunderes i PVC-fritt infusjonssett. Følger med posen fra apoteket. Husk filter.
Codan Connectsett kan brukes (ikke FloGard), samt vanlige 3-veiskraner (kun de korteste u/slange).

Puls og BT måles før premedikasjon + 15 min og 30 min etter start av Taxol, og etter 3 timer (v/avslutning av Taxol-infusjonen)

	Kl.slett	BT	Puls	(Resp.)	Sign.	Annet
Før premed.						
Etter 15 min. Taxol						
Etter 30 min.						
Ved avslutning						

Administrering av Taxol:

- Akuttskrin, BT-apparat, stetoskop, temp.mål skal være inne på pasientrommet.
- Lege på avdelingen skal være informert om at Taxol skal gis.
- Pasienten kan reise umiddelbart etter kur dersom alt har gått uten komplikasjoner.
- Evt. resept på smertestillende (Napren-E) dersom pasienten har hatt myalgi som følge av de foregående Taxolkurene.