

 Universitetssykehuset Nord-Norge Kreftavdelingen	Herceptin + Taxol 2. kur	Barkode	Utarbeidet: 1/06 MK Revidert 03/14 Ark nr: 1/2
	Ca. mammae		

Éndags kur: Herceptin + Taxol
Dag 1, dato:

Premedisinering/hydrering før Herceptin + Taxol	Infusjonstid	Kl.slett	Sign.
Prehydrering: 500 ml NaCl 0.9%	30 min		
- Dexametason 8 mg iv. * 30 min. før kur	Bolus		
- Deksklorfeniramin 5 mg iv. * 30 min. før kur	Bolus		
- Ranitidin 50 mg iv. * 30 min. før kur	Bolus		
- Paracetamol 1 g 30 min. før kur	Peroralt		

NB! Alle iv.-medikamenter settes fortløpende i inj.stussen på hydr.dryppet med NaCl.

KUR:

Medikament	Infusjonstid	Start kl.	Sign.
Herceptin i 250 ml NaCl 0.9%	30 min.		
Taxol i 250 ml NaCl 0.9%	1 time		
Posthydrering: 500 ml NaCl 0.9%	30 min.		

NB! Taxol skal infunderes i PVC-fritt infusjonssett. Flerarmet Codan Connectsett kan brukes (ikke FloGard), samt vanlige 3-veiskraner (kun de korteste u/slange). Husk filter!

Se neste side vedr. observasjoner

Administrering av Taxol + Herceptin:

- Akuttskrin, BT-apparat, stetoskop, temp.mål skal være inne på pasientrommet.
- Lege på avdelingen skal være informert om at Taxol + Herceptin skal gis.
- Ved bivirkninger skal infusjonen stoppes øyeblikkelig. Den kan starte igjen med 50% hastighet når symptomene har forsvunnet.
- Ved ytterligere reaksjon, reduseres dosen til 25%.
- Etterskyl med 100 ml NaCl 0.9%.
- Pasienten kan reise umiddelbart etter kur dersom alt har gått uten komplikasjoner.
- Evt. resept på smertestillende (Napren-E) dersom pasienten har hatt myalgi som følge av de foregående Taxolkurene.

Observasjoner ifm. Herceptin + Taxol: Anafylaksiberedskap skal alltid være tilgjengelig!

	Kl.slett	BT	Puls	Temp.	Resp.	Sign.
Før premedikasjon						
Etter 15 min.						
Etter 30 min.						
Ved avslutning						