

 Universitetssykehuset Nord-Norge Kreftavdelingen	Taxol 1. og 2. kur	Barkode	Utarbeidet: 11/07 MK Revidert 03/14 Ark nr: 1 av 1
	Ca. mammae		

Dato/årstall:

Premedisinering/hydrering før Taxol	Infusjonstid	Kl.slett	Sign.
Prehydrering: 500 ml NaCl 0.9%	30 min		
- Dexametason 8 mg iv. 30 min. før kur	Bolus		
- Deksklorfeniramin 5 mg iv. 30 min. før kur	Bolus		
- Zantac 50 mg iv. 30 min. før kur	Bolus		

NB! Alle medikamentene settes fortløpende i inj.stussen på hydr.dryppet med NaCl.

Cytostatika	Infusjonstid	Kl.slett	Sign.
Taxol i 250 ml NaCl 0.9%	1 time		
Posthydrering: 500 ml NaCl 0.9%	30 min.		

NB! Taxol skal infunderes i PVC-fritt infusjonssett. Flerarmet Codan Connectsett kan brukes (ikke FloGard), samt vanlige 3-veiskraner (kun de korteste u/slange). Husk filter!

Puls og BT måles før premedikasjon + 15 min og 30 min etter start av Taxol, og etter 1 time (v/avslutning av Taxol-infusjonen)

	Kl.slett	BT	Puls	(Resp.)	Sign.	Annet
Før premed.						
Etter 15 min. Taxol						
Etter 30 min.						
Ved avslutning						

Administrering av Taxol:

- Akuttskrin, BT-apparat, stetoskop, temp.mål skal være inne på pasientrommet.
- Lege på avdelingen skal være informert om at Taxol skal gis.
- Pasienten kan reise umiddelbart etter kur dersom alt har gått uten komplikasjoner.
- Evt. resept på smertestillende (Napren-E) dersom pasienten har hatt myalgi som følge av de foregående Taxolkurene.