

 <b>Universitetssykehuset</b> Nord-Norge  <b>Kreftavdelingen</b>	<b>Taxol</b>  <b>Fra 3. kur og videre</b>	Barkode	Utarbeidet: 11/07 MK Revidert mars 2014 Ark nr: 1 av 1
	<b>Ca. mammae</b>		

**Dato/årstall:**

Premedisinering/hydrering før Taxol	Infusjonstid	Kl.slett	Sign.
<b>Prehydrering:</b> 500 ml NaCl 0.9%	30 min		
- Dexamethason 4 mg iv. *	30 min. før kur	Bolus	
- Deksklorfeniramin 5 mg iv.	30 min. før kur	Bolus	
- Zantac 50 mg iv. *	30 min. før kur	Bolus	

**Alle medikamentene settes fortløpende i inj.stussen på hydr.dryppet med NaCl.**

**\* NB! Dersom ingen hypersensitivitet, seponeres Dexamethason, Deksklorfeniramin + Zantac som premed. fra 5. kur og videre. Gi da bare Versal 10 mg tbl som premedikasjon (ingen prehydrering).**

Cytostatika	Infusjonstid	Kl.slett	Sign.
<b>Taxol</b> i 250 ml NaCl 0.9%	1 time		
<b>Posthydrering:</b> 500 ml NaCl 0.9%	30 min.		

NB! Taxol skal infunderes i PVC-fritt infusjonssett. Flerarmet Codan Connectsett kan brukes (ikke FloGard), samt vanlige 3-veiskraner (kun de korteste u/slange). Husk filter!

**Puls og BT måles før premedikasjon + 15 min og 30 min etter start av Taxol, og etter 1 time (v/avslutning av Taxol-infusjonen).**

	Kl.slett	BT	Puls	(Resp.)	Sign.	Annet
Før premed.						
Etter 15 min. Taxol						
Etter 30 min.						
Ved avslutning						

**Administrering av Taxol:**

- Akuttskrin, BT-apparat, stetoskop, temp.mål skal være inne på pasientrommet.
- Lege på avdelingen skal være informert om at Taxol skal gis.
- Pasienten kan reise umiddelbart etter kur dersom alt har gått uten komplikasjoner.
- Evt. resept på smertestillende (Napren-E) dersom pasienten har hatt myalgi som følge av de foregående Taxolkurene.