


|   |  |         |   |
|---|--|---------|---|
|  <b>Universitetssykehuset</b><br>Nord-Norge<br><br><b>Kreftavdelingen</b> | <b>CiFu</b>  | Barkode | Utarbeidet: 6/06 MK<br>Revidert mars 2016<br>Ark nr: 1 av 1 |
|   | <b>Plateepitelcarcinom</b><br><b>Ca.ani, øsofagus, ØNH</b> |         |   |

**Dato dag 1:**

|   | Infusjonstid | Start kl. | Sign. |
|---|--------------|-----------|-------|
| <b>Prehydrering:</b><br>1000 ml NaCl 0.9%   | 2 timer      |           |       |
| <b>Kvalmeregime:</b><br>Odansetron 8 mg morgen og kveld<br>Dexametason 16 mg morgen | peroralt     |           |       |
| <b>Cisplatin</b><br>i 500 ml NaCl 0.9%  | 1 time       |           |       |
| <b>Posthydrering: *</b><br>1000 ml NaCl 0.9 %                                       | 2 timer      |           |       |
| 1000 ml NaCl 0.9%   | 2 timer      |           |       |

\* Startes samtidig med 5FU på pumpe.

|                                    | Dag 1<br>Start kl. | Dag 2<br>Start kl. | Dag 3<br>Start kl. | Dag 4<br>Start kl. | Dag 5<br>Start kl. |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5 FU på Cadd - pumpe over 24 timer |                    |                    |                    |                    | *                  |

\* NB! Ved CiFu anal + Cifu øsofagus gis 5FU i bare 4 døgn.

Måle diuresis fra dag 1 og ut første døgn. Diuresen bør være 400 ml/4 timer. Ta vekt om morgenen dag 2. Gi evt. Furosemid 10 mg iv ved behov.

|                      | Dag 1 | Dag 2 |
|----------------------|-------|-------|
| <b>Kl. 07 - 11</b>   |       |       |
| <b>Kl. 11 - 15</b>   |       |       |
| <b>Kl. 15 - 19</b>   |       |       |
| <b>Kl. 19 - 23</b>   |       |       |
| <b>Kl. 23 - 03</b>   |       |       |
| <b>Kl. 03 - 07</b>   |       |       |
| <b>Vekt x 2 dgl.</b> |       |       |
| <b>Vekt nr.:</b>     |       |       |