

 <b>Universitetssykehuset</b> Nord-Norge  <b>Kreftavdelingen</b>	<b>Paclitaxel + Karboplatin</b>	Barkode	Utarbeidet: 01/14 MJ Ark nr: 1 av 1
	<b>Spiserørskreft</b>		

**Kurnummer:**

**Dato/årstall:**

Premedisinering/hydrering før Paclitaxel	Infusjonstid	Kl.slett	Sign.
<b>Prehydrering:</b> 500 ml NaCl 0.9%	30 min		
- Fortecortin 8 mg iv, 4 mg fra 3. kur 30 min. før kur	Bolus		
- Deksklorfeniramin 5 mg iv. 30 min. før kur	Bolus		
- Zantac 50 mg iv. 30 min. før kur	Bolus		

**NB! Alle medikamentene settes fortløpende i inj.stussen på hydr.dryppet med NaCl.**

Cytostatika	Infusjonstid	Kl.slett	Sign.
<b>Paclitaxel</b> i 250 ml NaCl 0.9%	1 time		
<b>Karboplatin</b> i 250 ml glukose 5%	30 min.		

NB! Paclitaxel skal infunderes i PVC-fritt infusjonssett. Flerarmet Codan Connectsett kan brukes (ikke FloGard), samt vanlige 3-veiskraner (kun de korteste u/slange). Husk filter!

**Puls og BT måles før premedikasjon + 15 min og 30 min etter start av Paclitaxel, og etter 1 time (v/avslutning av Paclitaxel-infusjonen)**

	Kl.slett	BT	Puls	(Resp.)	Sign.	Annet
Før premed.						
Etter 15 min. Paclitaxel						
Etter 30 min.						
Ved avslutning						

### Administrering av Paclitaxel:

- Akuttskrin, BT-apparat, stetoskop, temp.mål skal være inne på pasientrommet.
- Lege på avdelingen skal være informert om at kur skal gis.
- Pasienten kan reise umiddelbart etter kur dersom alt har gått uten komplikasjoner.