

 Universitetssykehuset Nord-Norge Kreftavdelingen	ECF	Barkode	Utarbeidet: 6/06 MK Revidert mars 2014 Ark nr: 1 av 1
	Ca. ventriculi - Neoadjuvant - Lokalavansert, metastatisk		

Start tidlig på dagen med denne kuren – tar mange timer før 5FU-pumpen kan startes.

Dato dag 1:

	Tilsetninger	Infusjonstid	Start kl.	Sign.
Kvalme regime: Odansetron 8 mg x 2 po Dexamethason 4 mg x 3 po				
Epirubicin i 250 ml Glukose 5%		1 time		
Prehydrering: 1000 ml NaCl 0.9%	20 mmol Kaliumklorid + 20 mmol Magnesiumsulfat	90 min.		
Cisplatin i 1000 ml NaCl 0.9%		2 timer		
Cisplatin i 1000 ml NaCl 0.9%		2 timer		

Deretter startes pumpen med 5 FU.

	Dag 1 Start kl.	Dag 2 Start kl.	Dag 3 Start kl.	Dag 4 Start kl.	Dag 5 Start kl.
5 FU på CADD-pumpe over 24 timer					

Måle diurese fra dag 1 tom dag 2. Diuresen bør være 400 ml/4 timer.

Gi evt. Furosemid 10 mg iv ved behov.

	Dato dag 1	Dato dag 2
Kl. 07 - 11		
Kl. 11 - 15		
Kl. 15 - 19		
Kl. 19 - 23		
Kl. 23 - 03		
Kl. 03 - 07		
Vekt x 2 dgl. Vekt nr.:		