

 Universitetssykehuset Nord-Norge Kreftavdelingen	ECX	Barkode	Utarbeidet: 01.07 MK Revidert 03/14 Ark nr: 1 av 1
	Ca. ventriculi		

Dato dag 1:

Kvalmeregime:	Administrering	Gitt kl.	Sign.
Odansetron 8 mg x 2 daglig	P.o		
Medrol 32 mg x 2 daglig	P.o		

Dato dag 1:

	Infusjonstid	Start kl.	Sign.
Prehydrering: 1000 ml NaCl 0.9%	1 time		
Epirubicin i 100 ml Glukose 5%	15 min		
Cisplatin i 1000 ml NaCl 0.9%	1 time		
Posthydrering: 1000 ml NaCl 0.9% tilsatt: - 30 mmol KCl - 20 mmol Mg sulfat	2 timer		

NB! Husk Xeloda- administrasjon (peroralt): Se kurbeskrivelsen + kurve.

Måle diurese. Bør være 400 ml/4 timer. Ta vekt om morgenen dag 2.
Gi evt. Furosemid 10 mg iv ved behov.

	Dag 1
Kl. 07 - 11	
Kl. 11 - 15	
Kl. 15 - 19	
Kl. 19 - 23	
Kl. 23 - 03	
Kl. 03 - 07	
VEKT X 2 dgl.	
Vekt nr.:	