

 Universitetssykehuset Nord-Norge Kreftavdelingen	FLOT	Barkode	Utarbeidet: 09/17 MJ Ark nr 1 av 4
	Ventrikkcancer		

Kvalmeregime:

- **Deksametason: 8 mg x 2 i 3 dager, startes dagen før kur. Derson ikke tatt før kur kan den perorale dosen erstattes med 20 mg deksametason iv like før kur.**
- **Ondansetron 8 mg x 2 dag 1**

Dag 1: Docetaxel, Oksaliplatin og Kalsiumfolinat

Dag 1 : Fluorouracil (5 FU) på infusor eller Cadd pumpe

Ikke nødvendig med diurese måling på denne kuren

Sentralt venekateter innlegges før kur.

Obs. Bruk Glucose i infusjonssettet

Kur, dato:

	Inf. tid	Start kl.	Sign.
Docetaxel i 250 ml Glucose	1 time		

Anafylaksiberedskap – ha akuttskrinet tilgjengelig.

Blodtrykk og puls måles under Docetaxel-infusjonen ved kur 1 og 2.

	Kl.slett	BT	Puls
Før infusjon			
15 min.			
Ved avslutning			

	Inf. tid	Sign.
Oksaliplatin I 250 – 500 ml Glucose	1 – 2 timer	
Kalsiumfolinat I 250 ml Glucose	1 – 2 timer	
5 FU i Infusor eller Cadd pumpe over 22 timer		

Oksaliplatin og kalsiumfolinat kan gis samtidig over 2 timer, eller hver for seg over 1 time