

 Universitetssykehuset Nord-Norge Kreftavdelingen	Nab-paclitaxel (Abraxane) +Gemcitabin	Barkode	Utarbeidet: 11//14 Mette Kaspersen Magnar Johansen Ark nr: 1 av 1
	Metastatisk ca. pancreas		

Kur gis dag 1+8+15, deretter friuke. Ny syklus starter hver 4. uke.

Dato dag 1:

	Infusjonstid	Start kl.	Sign.
Kvalmeregime: Ondansetron 8 mg	Peroralt		
Nab-paklitaxel Bruk standard infusjonssett med 15 mikronfilter (ikke Taxol-filter). Obs! Svært lite volum.	30 min		
Gemcitabin i 250 ml NaCl 0.9 %	30 min		

Dato dag 8:

	Infusjonstid	Start kl.	Sign.
Kvalmeregime: Ondansetron 8 mg	Peroralt		
Nab-paklitaxel Bruk standard infusjonssett med 15 mikronfilter (ikke Taxol-filter). Obs! Svært lite volum.	30 min		
Gemcitabin i 250 ml NaCl 0.9 %	30 min		

Dato dag 15:

	Infusjonstid	Start kl.	Sign.
Kvalmeregime: Ondansetron 8 mg	Peroralt		
Nab-paklitaxel Bruk standard infusjonssett med 15 mikronfilter (ikke Taxol-filter). Obs! Svært lite volum.	30 min		
Gemcitabin i 250 ml NaCl 0.9 %	30 min		