

 Universitetssykehuset Nord-Norge Kreftavdelingen	CETUXIMAB Vedlikeholdskurer ukentlig	Barkode	Utarbeidet: 1/06 MK Revidert 03/14 Ark nr: 1/1
	Metastatisk colorektal- cancer		

Dato:

Premedisinering før Cetuximab	Tidspunkt	Kl.	Sign.
Paracet 1 g peroralt	30 – 60 min. før Cetuximab		
Loratadin 10 mg peroralt	30 – 60 min. før Cetuximab		

NB! Premedikasjon er ikke nødvendig etter 6. kur, forutsatt at det ikke har vært reaksjon på tidligere infusjoner.

Medikament	Dose	Infusjonstid	Start kl.	Sign.
Cetuximab	250 mg/m ²	1 time		
Hydrering: * NaCl 0.9%	100 ml	1 time		

- ½ dråpetakt på Cetuximab første 10 min., deretter normal dråpetakt videre.
- * Hydreringen på 1 time er for å observere ift evt. reaksjoner etter Cetuximab-infusjon.

Observasjoner: Anafylaksiberedskap skal alltid være tilgjengelig!

	Kl.slett	BT	Puls	Temp.	Resp.	Sign.
Før kurstart						
Etter 10 min.						
Etter 30 min.						
Ved avslutning av kur						
1 time e. avsluttet kur						

Hvis pasienten ikke er stabil eller får reaksjoner, må en fortsette målinger hvert 10 min. inntil pasienten er stabil og reaksjonene er forsvunnet.