

 <b>Universitetssykehuset Nord-Norge</b>  <b>Kreftavdelingen</b>	<b>CETUXIMAB + FLIRI</b>  <b>1. kur</b>	Barkode	Utarbeidet: 5/06 MK Revidert 03/14 Ark nr: 1/2
	<b>Metastatisk colorektal- cancer</b>		

- **Cetuximab gis ukentlig. Høyere dose og lengre infusjonstid ved 1. kur enn ved deneste kurene – fra 2. kur og videre. (vedlikeholdskurene).**
- **Eget infusjonsskjema for vedlikeholdskur med Cetuximab (fra 2. Cetuximabkur)**
- **Fliri gis hver 2. uke.**

**Dato:**

<b>Premedisinering før Cetuximab</b>	<b>Tidspunkt</b>	<b>Kl.</b>	<b>Sign.</b>
Paracetamol 1 g peroralt	30 – 60 min. før Cetuximab		
Deksklorfeniramin 6 mg peroralt	30 – 60 min. før Cetuximab		

<b>Medikament</b>	<b>Dose</b>	<b>Infusjonstid</b>	<b>Start kl.</b>	<b>Sign.</b>
<b>Cetuximab</b>	400 mg/m <sup>2</sup>	2 timer		
<b>Hydrering: *</b> NaCl 0.9%	100 ml	1 time		

- ½ dråpetakt på Cetuximab første 10 min., deretter normal dråpetakt videre.
- \* Hydreringen på 1 time er for å observere ift evt. reaksjoner etter Cetuximab-infusjon før Fliri-kur kan startes.

**Observasjoner: Anafylaksiberedskap skal alltid være tilgjengelig!**

	<b>Kl.slett</b>	<b>BT</b>	<b>Puls</b>	<b>Temp.</b>	<b>Resp.</b>	<b>Sign.</b>
Før kurstart						
Etter 15 min.						
Etter 30 min.						
Etter 60 min						
Ved avslutning av kur						
Etter 3 timer						

Hvis pasienten ikke er stabil eller får reaksjoner, må en fortsette målinger hvert 10 min. inntil pasienten er stabil og reaksjonene er forsvunnet.

**Fliri-kur: se neste side!**

## Fliri-kur

### Dato dag 1:

	Inf. tid	Start kl.	Sign.
<b>Kvalmeregime:</b> Odansetron 8 mg og Dexametason 16 mg	po		
<b>Premedikasjon før Campto: (se tekst under)</b> Atropin 0.5 mg	sc		
<b>Campto</b> i 250 ml NaCl 0.9 %	1 time		
<b>5 FU</b> i 50 ml NaCl 0.9 %	< 5 min		
Deretter gis NaCl 0.9% i rolig drypp i 20–30 min før Kalsiumfolinat gis			
<b>Kalsiumfolinat (Rescuvolin)</b> i 100 ml NaCl 0.9 %	5 min		

**Premedikasjon settes rett før Campto gis.**

**Atropin kan gis flere ganger ved symptomer på akutt kolinerg syndrom (se kurbeskrivelse).**

### Dato dag 2:

<b>Kvalmeregime:</b> Odansetron og Dexametason 16 mg	po		
<b>5 FU</b> i 50 ml NaCl 0.9 %	< 5 min		
Deretter gis NaCl 0.9% i rolig drypp i 20–30 min før Kalsiumfolinat gis			
<b>Kalsiumfolinat (Rescuvolin)</b> i 100 ml NaCl 0.9 %	5 min		