

 <b>Universitetssykehus et Nord-Norge</b>  <b>Kreftavdelingen</b>	<b>CETUXIMAB + FLIRI</b>  <b>2. kursyklus og videre</b>	Barkode	Utarbeidet: 5/06 MK Revidert 03/14 Ark nr: 1/2
	<b>Metastatisk colorektal- cancer</b>		

- **Cetuximab gis ukentlig.**
- **Fliri gis hver 2. uke.**

**Dato:**

Premedisinering før Cetuximab	Tidspunkt	Kl.	Sign.
Paracetamol 1 g peroralt	30 – 60 min. før Cetuximab		
Deksklorfeniramin 6 mg peroralt	30 – 60 min. før Cetuximab		

Medikament	Dose	Infusjonstid	Start kl.	Sign.
<b>Cetuximab</b>	250 mg/m <sup>2</sup>	1 time		
<b>Hydrering: *</b> NaCl 0.9%	100 ml	1 time		

- ½ dråpetakt på Cetuximab første 10 min., deretter normal dråpetakt videre.
- \* Hydreringen på 1 time er for å observere ift evt. reaksjoner etter Cetuximab-infusjon før Campto kan startes.

**Observasjoner: Anafylaksiberedskap skal alltid være tilgjengelig!**

	Kl.slett	BT	Puls	Temp.	Resp.	Sign.
Før kurstart						
Etter 15 min.						
Etter 30 min.						
Ved avslutning av kur						
1 time e. avsluttet kur						

Hvis pasienten ikke er stabil eller får reaksjoner, må en fortsette målinger hvert 10 min. inntil pasienten er stabil og reaksjonene er forsvunnet.

**Fliri-kur: se neste side!**

## Fliri-kur:

### Dato dag 1:

	Inf. tid	Start kl.	Sign.
<b>Kvalmeregime:</b> Odansetron 8 mg og Dexametason 16 mg	po		
<b>Premedikasjon før Campto: (se tekst under)</b> Atropin 0.5 mg	sc		
<b>Campto</b> i 250 ml NaCl 0.9 %	1 time		
<b>5 FU</b> i 50 ml NaCl 0.9 %	< 5 min		
Deretter gis NaCl 0.9% i rolig drypp i 20–30 min før Kalsiumfolinat gis			
<b>Kalsiumfolinat (Rescuvolin)</b> i 100 ml NaCl 0.9 %	5 min		

**Premedikasjon settes rett før Campto gis.**

**Atropin kan gis flere ganger ved symptomer på akutt kolinerg syndrom (se kurbeskrivelse).**

### Dato dag 2:

<b>Kvalmeregime:</b> Odansetron 8 mg og Dexametason 16 mg	po		
<b>5 FU</b> i 50 ml NaCl 0.9 %	< 5 min		
Deretter gis NaCl 0.9% i rolig drypp i 20–30 min før Kalsiumfolinat gis			
<b>Kalsiumfolinat (Rescuvolin)</b> i 100 ml NaCl 0.9 %	5 min		