

 Universitetssykehuset Nord-Norge Kreftavdelingen	CETUXIMAB + IRINOTECAN 1. kur	Barkode	Utarbeidet: 1/06 MK Revidert 03/14 Ark nr: 1/2
	Metastatisk colorektal- cancer		

- **Cetuximab gis ukentlig. Høyere dose og lengre infusjonstid ved 1. kur enn ved de neste kurene – fra 2. kur og videre. (vedlikeholdskurene).**
- **Eget infusjonsskjema for vedlikeholdskur med Cetuximab (fra 2. Cetuximab-kur...)**
- **Irinotecan (Campto) gis hver 3. uke.**

Dato:

Premedisinering før Cetuximab	Tidspunkt	Kl.	Sign.
Paracetamol 1 g peroralt	30 – 60 min. før Cetuximab		
Deksklorfeniramin 6 mg po	30 – 60 min. før Cetuximab		

Medikament	Dose	Infusjonstid	Start kl.	Sign.
Cetuximab	400 mg/m ²	2 timer		
Hydrering: * NaCl 0.9%	100 ml	1 time		

- ½ dråpetakt på Cetuximab første 10 min., deretter normal dråpetakt videre.
- * Hydreringen på 1 time er for å observere ift evt. reaksjoner etter Cetuximab-infusjon før Irinotecan kan startes.

Observasjoner: Anafylaksiberedskap skal alltid være tilgjengelig!

	Kl.slett	BT	Puls	Temp.	Resp.	Sign.
Før kurstart						
Etter 10 min.						
Etter 30 min.						
Etter 60 min						
Ved avslutning av kur						
Etter 3 timer						

Hvis pasienten ikke er stabil eller får reaksjoner, må en fortsette målinger hvert 10 min. inntil pasienten er stabil og reaksjonene er forsvunnet.

Irinotecan-infusjon: se neste side!

Irinotecan-infusjon:

Medikament	Infusjonstid	Start kl.	Sign.
Kvalmeregime: Odansetron 8 mg og Dexametason 16 mg	po		
Premedikasjon rett før Irinotecan gis: Atropin 0.5 mg sc	sc		
Irinotecan i 250 ml NaCl 0.9%	90 min.		

Vedr. diareproblematikk som følge av Irinotecan – se kurbeskrivelse. Husk resept på Loperamid.