

 Universitetssykehuset Nord-Norge Kreftavdelingen	Fliri (Campto + FLV)	Barkode	Utarbeidet: 1005 mk Revidert 03/14 Ark nr: 1 av 1
	Metastatisk colorektal cancer		

Dato dag 1:

	Inf. tid	Start kl.	Sign.
Kvalmeregime: Odansetron 8 mg + Dexamethason 16 mg	peroralt		
Premedikasjon før Campto: (se tekst under) Atropin 0.5 mg	sc		
Campto i 250 ml NaCl0.9 %	1 time		
5 FU i 50 ml NaCl0.9 %	< 5 min		
Deretter gis NaCl0.9% i rolig drypp i 20–30 min før Kalsiumfolinat gis			
Kalsiumfolinat (Rescuvolin) i 50 ml NaCl0.9 %	5 min		

Premedikasjon settes rett før Campto gis.

Atropin kan gis flere ganger ved symptomer på akutt kolinerg syndrom (se kurbeskrivelse).

Dato dag 2:

Kvalmeregime: Odansetron 8 mg po	peroralt		
5 FU i 50 ml NaCl0.9 %	< 5 min		
Deretter gis NaCl0.9% i rolig drypp i 20–30 min før Kalsiumfolinat gis			
Kalsiumfolinat (Rescuvolin) i 50 ml NaCl0.9 %	5 min		