

 Universitetssykehuset Nord-Norge Kreftavdelingen	XELOX (Oxaliplatin + Xeloda)	Barkode	Utarbeidet: 11/07 mk Revidert 03/14 Ark nr: 1 av 1
	Metastatisk colorektal cancer		

Behandlingsplan: Èn syklus = 3 uker:

- Oxaliplatin-infusjon dag 1,
- 2 uker peroral behandling med Xeloda,
- 1 uke behandlingsfri

NB! Bruk Glucose 5% i infusjonssettet pga Oxaliplatin!!

Dato/årstall:

	Inf. tid	Start kl.	Sign.
Kvalmeregime: Odansetron 8 mg x 2 dag 1 Evt. Methylprednisolon 32 mg x 1 dag 1	Peroralt		
Oxaliplatin i 500 ml Glucose 5% - Øk infusjonstiden til 120 min ved laryngopharyngeal dysesthesia eller larynxspasmer - Øk infusjonstiden til 120 min ved irritasjon/smerte i venen under adm. av Oxaliplatin	1 time		
Xeloda (Capecitabine) peroralt (se kurbeskrivelsen) En dose morgen og en om kvelden. Finnes som tbl i dosene 150 mg og 500 mg. Tas sammen med mat og innen 30 minutter etter avsluttet måltid.	Tas fra dag 1 (kvelden) tom morgenen dag 15		