

 Universitetssykehuset Nord-Norge Kreftavdelingen	Cisplatin + etoposid	Barkode	Utarbeidet: April 2016/MK/MJJ
	Nevroendokrint karsinom		

Kvalmeforebyggende regime

	Dag 1	Dag 2	Dag 3
Akynzeo (netupitant og palonosetron)	1 kapsel ca. 1 time før kur		
Dexametason	12 mg	8 mg	8 mg
Metoklopramid	10 mg ved behov inntil x 3		

Administrering:

Medikament	Infusjonstid	Dag 1	Dag 2	Dag 3
Prehydrering: 1000 ml NaCl 0,9 % +20 mmol KCl +10 mmol Mg-sulfat	2 timer	Start kl.: Vekt:		
Etoposid i 500 ml NaCl 0,9 %	30*–60 min. Gis samtidig med siste del av prehydringa.	Start kl.:		
Cisplatin i 1000 ml NaCl 0,9 %	1 time	Start kl.: Vekt:		
Posthydrering: 1000 ml NaCl 0,9 % +20 mmol KCl +10 mmol Mg-sulfat	2 timer	Start kl.: Vekt:		
Etoposid kapsler	2 ganger daglig. Fastende.			

*Obs blodtrykksfall ved rask infusjon av etoposid, men sjelden problem ved 30 min.

- Bør drikke 2 liter dagen før og etter kur og rikelig samme dag slik at diuresen kommer godt i gang.
- Diuresen bør være 100 ml/t, vanligvis ikke nødvendig å måle rutinemessig, men ved usikkerhet må timediuresen monitoreres.
- Vekt før, under og etter kur.
- Ved manglende diurese eller vektøkning > 2 kg, gis 20–40 mg furosemid eller 50 mg mannitol.