

 Universitetssykehuset Nord-Norge Kreftavdelingen	CiFu	Barkode	Utarbeidet: 6/06 MK Revidert 03/14 Ark nr: 1 av 1
	Plateepitelcarcinom Ca.ani, øsofagus, ØNH		

Dato dag 1:

	Infusjonstid	Start kl.	Sign.
Prehydrering: 1000 ml NaCl 0.9%	2 timer		
Kvalmeregime: Odansetron 8 mg og Dexametason 16 mg	p.o		
Cisplatin i 500 ml NaCl 0.9%	1 time		
Posthydrering: * 1000 ml NaCl 0.9 %	2 timer		
1000 ml NaCl 0.9%	2 timer		

* Startes samtidig med 5FU på pumpe.

	Dag 1 Start kl.	Dag 2 Start kl.	Dag 3 Start kl.	Dag 4 Start kl.	Dag 5 Start kl.
5 FU på Cadd - pumpe over 24 timer					*

* NB! Ved CiFu anal + Cifu øsofagus gis 5FU i bare 4 døgn.

Måle diuresis fra dag 1 og ut første døgn. Diuresen bør være 400 ml/4 timer. Ta vekt om morgenen dag 2. Gi evt. Furosemid 10 mg iv ved behov.

	Dag 1	Dag 2
Kl. 07 - 11		
Kl. 11 - 15		
Kl. 15 - 19		
Kl. 19 - 23		
Kl. 23 - 03		
Kl. 03 - 07		
Vekt x 2 dgl. Vekt nr.:		

