

 Universitetssykehuset Nord-Norge Kreftavdelingen	Paclitaxel Infusjon	Barkode	Utarbeidet: 11/17 MK/ESm Ark nr: 1 av 2
	Metastatisk analkreft		

GENERELL INFORMASJON OM KUREN:

Ved polikliniske kurer:

Pasienten bør komme dagen før til blodprøvetaking, vekt, og samtale/forberedelse. Det fordres tidlig kurstart om morgenen i tilfelle reaksjoner på Paclitaxel (lengre infusjonstid). Kuren skal primært bestilles av lege dagen før kurstart.

Premedisineringer:

- Dexamethason 20 mg po kvelden før kur, samt på morgenen kurdagen (dette tar pas. selv)
- Dersom pasienten har glemt å ta full dose med Dexamethason, gis Dexamethason 20 mg **iv.** i NaCl 100 ml 30 min før kurstart.
- Ranitidin 150 mg po.
- Deksklorfeniramin 5 mg iv i injeksjonsstussen på iv-slangen.
- NB! Dersom det går mer enn 1,5 timer fra premedisineringsen til kurstart, må Ranitidin og Deksklorfeniramin-dosen gjentas.
- Kvalmestillende: Afipran/metoklopramid ved behov

Overvåking ifm Paclitaxel:

- BT/p tas før premedisineringsen, ved oppstart av Paclitaxel og 15 + 30 min. etter start av Paclitaxel, samt ved avslutning.
- Pasientens skal overvåkes de første 30 minuttene etter oppstart.
- En ev allergisk reaksjon kommer som regel 1. infusjonens første minutter – opptil 10 min etter start. Stopp da infusjonen umiddelbart!! Se eget skriv for håndtering av hypersensitivitetsreaksjoner [her](#).

Etterhydrering:

- Det gis bare etterhydrering ved behov.

Praktisk:

- Klargjør 1 infusjonssett med 2-armet Codan med NaCl 250-500 ml med PVC-fritt infusjonssett + filter. Kobles på 3-veis-kranen.

PACLITAXEL - INFUSJONSSKJEMA.

Dag – 1 (kvelden før kur)

Premedisinering	Infusjonstid	Kl.slett	Sign.
Dexamethason 20 mg	Peroralt		

Dag 1 (kurdagen) 30 – 60 minutt før oppstart Paclitaxel.

Premedisinering	Infusjonstid	Kl.slett	Sign.
Dexamethason 20 mg – tas om morgenen	Peroralt		
Ranitidin 150 mg	Peroralt		
Deksklorfeniramin 5 mg *	Iv bolus		

*Settes i infusjonsslangen til hydreringssettet.

Cytostatika	Infusjonstid	Kl.slett	Sign.
NaCl 1000 ml Settes i gang ved premedikasjon (ca 30-60 min. før start av Paclitaxel), og skal gå parallelt med Paclitaxel-infusjonen i samme 3-veis-kran	3,5 timer, evt lengre..		
Paclitaxel i 500 ml NaCl	3 timer		

NB! Paclitaxel skal infunderes i PVC-fritt infusjonssett + filter!

Puls og BT måles før premedikasjon + 15 min og 30 min etter start av Paclitaxel, og v/avslutning.

	Kl.slett	BT	Puls	(Resp.)	Sign.	Annet
Før premed.						
Etter 15 min. Paclitaxel						
Etter 30 min.						
Ved avslutning						

Administrering av Paclitaxel:

- Akuttskrin, BT-apparat, stetoskop, temp.mål skal være inne på pasientrommet.
- Lege på avdelingen skal være informert om at Paclitaxel skal gis.
- Pasienten kan reise umiddelbart etter kur dersom alt har gått uten komplikasjoner.
- Evt. resept på antiflogistika dersom pasienten har hatt myalgi som følge av de foregående Paclitaxelkurene.