

Kritisk informasjon Hyperkalemisk periodisk paralyse

Periodiske paralyser er sjeldne arvelige nevro-muskulære sykdommer som kjennetegnes ved akutte anfall med muskelsvakhet. Muskelstivhet kan også forekomme.

Anfall kan utløses av faste, kuldeeksponering, fysiske utmattelse, frukt eller annen kaliumrik mat.

Anfall kan stoppes med lett fysisk aktivitet eller inntak av sukker.

Narkose

OBS: Behandling med bedøvelsesmidler kan gi risiko for komplikasjoner (malign hypertermi). Nevromuskulære blokkere som succinylcholin, og narkosegasser bør unngås.

Alert information Hyperkalemic Periodic Paralysis

Periodic paralysis is a rare hereditary neuromuscular disease characterized by acute attacks with muscle weakness. Muscle stiffness may also occur.

Attacks can be triggered by fasting, cold temperature exposure, physical fatigue, fruit or other potassium-rich foods. Attacks may be treated with sugar or mild exercise.

Anaesthetics

Note: Anaesthetics may pose a risk of complications (malignant hyperthermia). Neuromuscular blockade (succinylcholine) and inhaled anaesthetics should be avoided.

Utarbeidet av NMK-samarbeidet mai-19